

**ORDONNANCE POUR L'AJUSTEMENT DES HYPOGLYCÉMIANTS
ORaux ET DE L'INSULINE POUR LE DIABÈTE DE TYPE 2 PAR LES
INFIRMIÈRES DES CLINIQUES TRANSITOIRES DU GAP DES
LAURENTIDES SELON LE PROTOCOLE DE L'INESSS**

Patient : Nom du Patient
RAMQ : NAM
Adresse : Adresse

Date de naissance : Date
Téléphone : Téléphone

L'infirmière de la clinique transitoire contactera la pharmacie pour aviser des ajustements de posologies à l'intérieur des cibles suivantes :

Cibles thérapeutiques					
HbA1c	valeur %	Glycémie préprandiale	valeur mmol/L	Glycémie 2h postprandiale	valeur mmol/L

L'infirmière clinicienne communiquera avec le prescripteur autorisé en cas d'hypoglycémies (\leq valeur mmol/L) ou d'hyperglycémies (\geq valeur mmol/L) fréquentes.

Précisions supplémentaires : Click or tap here to enter text.

1^{ER} MEDICAMENT	
Nom du médicament :	nom
Posologie initiale :	Posologie
Dose maximale :	Dose
Renouvellements :	Renouvellements

2^E MEDICAMENT	
Nom du médicament :	nom
Posologie initiale :	Posologie
Dose maximale :	Dose
Renouvellements :	Renouvellements

! Si la cible thérapeutique n'est pas rencontrée malgré l'atteinte de la posologie maximale tolérée du 1^{er} médicament :

- Option A : Cesser le 1^{er} médicament et débiter le 2^e médicament
- Option B : Poursuivre le 1^{er} médicament et débiter le 2^e médicament
- Option C : Aviser un médecin/IPSP

Notez bien qu'à la fin des suivis en clinique transitoire, le pharmacien sera avisé par l'infirmière de la clinique afin de poursuivre le suivi et l'ajustement de la médication ci-dessus.

PHARMACIE	
Pharmacie :	Pharmacie
Pharmacien :	Pharmacien
Téléphone :	Téléphone
Télécopieur :	Télécopieur

CLINIQUE	
Nom du prescripteur :	Médecin
No. de pratique :	Numéro
Adresse :	Adresse
Téléphone :	Téléphone
Télécopieur :	Télécopieur

Signature du prescripteur autorisé

Date