





Enjeux





ENJEUX

- Forte transmission communautaire dans plusieurs régions du Québec;
- Mesures de confinement partielles en comparaison avec la première vague;
- Milieux de vie et de soins plus accessibles que lors de la première vague;

Risque accru de contamination des usagers et des travailleurs dans les milieux.





Enjeux


Travailleurs de la santé:

- 409 éclosions depuis le 1^{er} Septembre 2020 Causes probables :
 - Travailleurs: 46 %
 - Usagers, proches, autres: 40 %
 - Indéterminée : 14 %

Données régionales – Cause probable: Travailleur

- Montréal: 52 %
- Capitale-Nationale : 45 %
- Montérégie : 32 %









Problématiques spécifiques






PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

En milieux de travail:

- Travailleurs de la santé sont l'une des causes principales de l'introduction de la COVID-19 dans les milieux;
- Un haut taux de contamination des travailleurs lors d'une éclosion;
- Imprudence lors des périodes de pauses;
- Fatigue et surcharge de travail = risques de bris de procédure PCI;
- Niveaux de formation variables;
- Vétusté de certains milieux: ne favorise pas l'application des mesures et le respect de la distanciation.






PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Gestions des milieux et des éclosions:

- Organisation, stratégie et efficacité variables dans la gestion des éclosions, délais non optimisés impactant la prise en charge;
- Soutien aux milieux privés variables impactant la prise en charge;
- Rigueur inégale dans la formation du personnel;
- Compréhension inégale des rôles et responsabilités aux différents paliers de gestion;
- Manque de connaissances en matière de prévention et contrôle des infections;
- Efficacité limitée des mesures pour clientèles errantes et avec troubles cognitifs.





Actions supplémentaires






Deux axes d'intervention:

- Prévention;
- Gestion des éclosions.






Prévention

Mesures spécifiques employés

- 1. Intensification des activités de sensibilisation des employés:
 - Nouvelle campagne de sensibilisation soutenue;
 - Capsules de leaders cliniques sur l'importance du respect des règles PCI;
 - Capsules d'encouragement des employés par les PDG;
- 2. Stratégie ciblée de formation des champions PCI:
 - Offensive de formation dans les milieux à forte transmission communautaire;
- 3. Main-d'œuvre indépendante:
 - Exiger dès maintenant que la MOI suive la formation de base en PCI identifiée par le MSSS.





Prévention



Ne laissons pas le virus franchir nos portes.

Au travall comme à l'extérieur, restons vigilants et mobilisés en appliquant les régles santaress (levege de mains, ostanciation, port du maisque).

Québec ::::

Espace partagé



Salle de repos



Lavage de mains







.

Prévention

Mesures spécifiques gestionnaires (CISSS, CIUSSS, Milieux de vie)

- Intensifier le suivi des formations du personnel aux pratiques de base en PCI;
- Former l'ensemble des gestionnaires de milieux comme formateur PCI;
- S'assurer que l'aménagement des aires de repos dans l'ensemble des milieux permette le respect des règles de distanciation et d'hygiène des mains;
- Aménager les espaces communs pour favoriser le respect des mesures de PCI;
- Assurer une surveillance accrue des aires de repos des employés ou moments de pause (intérieur et extérieur);
- Assurer une vigie régulière des exploitants privés et suivi des mesures correctrices;
- Établir une surveillance systématique des symptômes des usagers et travailleurs pour réduire les délais de test et d'application des mesures;
- Faire la surveillance du port adéquat de l'uniforme par les travailleurs.





Gestion des éclosions

Mesures spécifiques gestionnaires CISSS et CIUSSS

- Prévoir et communiquer un protocole d'intervention et de prise en charge d'une éclosion, incluant une structure de gestion multidisciplinaire pour soutenir l'ensemble des milieux sur le territoire de l'établissement;
- Outiller les gestionnaires de milieux pour clarifier leur rôle et responsabilités en prévention et dans la gestion d'une éclosion;
- S'assurer d'un processus d'enquête rapide des contacts lors d'un cas positif dans un milieu de vie ou de soins;
- Informer le MSSS dans les meilleurs délais si des retards d'analyse de laboratoires impactent la confirmation de résultats pour des milieux en éclosion;
- Déployer la stratégie de dépistage selon les directives de la santé publique;
- Mise en place d'équipes médicales d'intervention (ÉMI).



