

Évaluation de l'usager lors des soins à domicile - Cas suspecté ou confirmé COVID-19

Communiquer avec l'usager et valider la possibilité de reporter la visite à domicile

OUI

Annulation de la visite

NON

Communiquer avec l'usager avant la visite ou vérifier au moment de la visite, si l'usager ou une autre personne au domicile présente des symptômes de la COVID-19 ou répond positivement aux critères d'exposition. Se référer à l'aide-mémoire *COVID-19 Critères et symptômes – PCI CISSS des Laurentides*
En présence de critères de sévérité, se référer à une infirmière ou une ICASI pour une évaluation et la conduite à tenir

NON

OUI

POUR UNE DISTRIBUTION DE MÉDICAMENTS

- Aviser l'usager de prévoir un verre d'eau
- Laisser la médication près de la porte à l'extérieur
- Frapper à la porte et reculer d'au moins 2 mètres
- Vérifier la prise de médication

POUR ADMINISTRER UN SOIN OU UN TRAITEMENT

Dès l'arrivée au domicile, revêtir l'ÉPI à l'extérieure ou dans l'entrée et appliquer les précautions additionnelles *
« GOUTTELETTES CONTACT + »

- Si interventions médicales générant des aérosols (IMGA), rehausser les précautions additionnelles à « **AÉRIEN CONTACT GOUTTELETTES** » (port du masque N95 et blouse imperméable)
- Port du masque de procédure pour l'usager
Lui laisser le masque par la suite pour qu'il puisse le mettre s'il doit se rendre dans un centre de santé. (Si indisponible, il peut se couvrir le nez et la bouche avec un linge propre ou un papier mouchoir)

- Apporter seulement le matériel requis, laisser vos effets personnels dans votre voiture
- Votre équipement de protection individuelle et le strict matériel doivent être placés dans un étui en plastique
- Privilégier le matériel à usage unique
- Limiter les contacts avec l'environnement de l'usager
- S'abstenir de se toucher les yeux, le nez ou la bouche
- Administrer les soins et les traitements requis
- S'assurer que l'usager ait un thermomètre à sa disposition pour l'auto-surveillance, si pas de thermomètre, prendre la température selon jugement clinique ou référer à l'infirmière
- Remettre le document «*Étapes en cas de symptômes - Coronavirus (COVID-19)*» du ministère de la Santé et des Services Sociaux, si requis
- Essuyer tout le matériel avec lingette désinfectante avant de le transporter dans le coffre de la voiture
- Avant de sortir du domicile, retirer l'ÉPI, (gants, jaquette), les mettre dans un sac de plastique. Garder le masque en tout temps (pas dans le cou, ni sous le nez). Retirer la protection oculaire à l'extérieur du domicile, procéder à sa désinfection, et la placer dans un sac de plastique ou de papier. Procéder à l'hygiène des mains.

- Hygiène des mains de l'usager (prévoir une solution hydroalcoolique)
- Appliquer les pratiques de base :
 - Hygiène des mains
 - Maintien de la distance de 2 mètres avec l'usager
 - Port du masque de procédure si contact de moins de 2 mètres *
- Améliorer la circulation de l'air en ouvrant une fenêtre si possible

*
Lors des soins à domicile à moins de 2 mètres d'un usager, appliquer le port prolongé du masque de procédure pour une période de 4 h, sans le retirer entre les soins de plusieurs usagers (2 masques par quart de travail)