

DESTINATAIRES :	Tout le personnel du CISSS des Laurentides
EXPÉDITEUR :	Sylvain Pomerleau, directeur général adjoint - Programme santé physique générale et spécialisée, de l'enseignement et de la recherche
DATE :	13 avril 2020
OBJET :	NOUVEAUX SUBSTITUTS AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES OXIVIR TB

Dans la situation actuelle de pandémie, il est possible que vous receviez différentes lingettes en substitut aux lingettes Oxivir TB utilisées habituellement. Il est à noter que les produits de remplacement ont des temps de contact humide qui diffèrent de celui des lingettes Oxivir TB.

Toutes ces lingettes peuvent être utilisées pour la désinfection COVID-19.

Nous vous demandons également de conserver les contenants de lingettes désinfectantes en prenant soin de refermer leur couvercle et de les déposer dans le sac prévu à cette fin dans les unités, nous procéderons au remplissage par la suite.

Nous vous remercions pour votre fidèle collaboration.

Produits	Indications
 Lingettes habituelles	Lingettes Oxivir TB à base de peroxyde d'hydrogène accéléré. GRM 47000219 Produit à privilégier pour désinfecter une zone potentiellement contaminée par la COVID-19. Il est important de respecter le temps de contact humide de 1 minute après le nettoyage.
 Substitut	Lingettes SABER à base de peroxyde d'hydrogène accéléré. Il est important de respecter le temps de contact humide de 5 minutes après le nettoyage.

 <p>Substitut</p>	<p>Lingettes Ultra Swipes à base d'alcool éthylique et d'O-phénylphénol.</p> <p>Il est important de respecter le temps de contact humide de <u>1 minute</u> après le nettoyage.</p>
 <p>Substitut</p>	<p>Lingettes GermiCide 3 à base d'ammonium quaternaire et 21% d'Étanol.</p> <p>Il est important de respecter le temps de contact humide de <u>3 minutes</u> après le nettoyage.</p>
 <p>Substitut</p>	<p>Lingettes Opticide 3 à base d'ammonium quaternaire et 21% d'Étanol.</p> <p>Il est important de respecter le temps de contact humide de <u>3 minutes</u> après le nettoyage.</p>