

DESTINATAIRE (S) : Gestionnaires des programmes de médecine, chirurgie, soins critiques, lutte contre le cancer, SAPA, logistique, coordonnateurs d'activités hospitalières, gestions des lits, Médecins, admission – Saint-Jérôme

EXPÉDITRICE : Service de prévention et contrôle des infections (PCI) de Saint-Jérôme

DATE : 30 octobre 2020

OBJET : **REHAUSSEMENT DU DÉPISTAGE À L'ARRIVÉE D'UN USAGER - HÔPITAL DE SAINT-JÉRÔME.**

Suite à la découverte de plusieurs cas positifs de la COVID-19 par acquisition communautaire dans nos établissements ces deux dernières semaines, de la transmission soutenue en communauté et de l'apparition de symptômes atypiques ou même inexistantes chez nos usagers, un rehaussement des mesures de dépistage doit être mis en place rapidement. Voici les mesures supplémentaires à instaurer dès maintenant auprès des usagers de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.

Usagers froids (vert)

- Dépistage dès leur arrivée au jour 0, comme à l'habitude.
- Pour les usagers de **l'urgence**, en **préopératoire** ainsi que les **transferts inter établissement**, deuxième dépistage **au jour 5** de leur présence dans l'hôpital.
- Aucune précautions additionnelles requises ou délai pour l'admission à l'étage dans l'attente du ou des résultats.

Usagers tièdes (jaune)

- Dépistage dès leur arrivée au jour 0, comme à l'habitude.
- Deuxième dépistage **au jour 5** de leur présence dans l'hôpital.
- Précaution additionnelle **jusqu'à l'obtention des 2 résultats négatifs**. Cesser suite à une validation avec l'équipe de PCI ou la microbiologie de garde.
- Advenant, qu'il n'y ait pas de place en zone tiède, à l'UHB ou au 5eD, les usagers tièdes principalement ceux ayant des pathologies, diagnostiques et symptômes respiratoires pourraient être admis au 3eD dans une chambre privée.

Usagers avec symptômes respiratoires

Pour tout usager présentant des symptômes respiratoires qui pourraient s'apparenter à la COVID-19 ou avec des diagnostics tel que MPOC exacerbé ou pneumonie, mettre en précautions additionnelles jusqu'à l'obtention de 2 résultats COVID-19 négatifs et cesser suite à une validation avec l'équipe de PCI ou la microbiologie de garde.