

DESTINATAIRE (S) :	Membres du personnel, gestionnaires des programmes de médecine, dialyse, oncologie, coordonnateurs d'activités hospitalières et médecins
EXPÉDITRICE :	Sylvain Pomerleau, directeur général adjoint des programmes santé physique, enseignement et recherche
DATE :	5 novembre 2020
OBJET :	AJOUT DE DÉPISTAGES RÉGULIERS DES USAGERS EN HÉMODIALYSE ET CANCÉROLOGIE

Dans un contexte de transmission soutenue en communauté et en cohésion avec le [Tableau d'utilisation des tests selon les paliers](#), de nouvelles mesures de dépistage doivent être mises en place.

Un dépistage régulier des usagers en hémodialyse et oncologie doit maintenant être initié dans l'ensemble de nos installations. Nous vous invitons à utiliser un registre de dépistage afin de faciliter le suivi des tests à effectuer.

Usagers en hémodialyse

- Dépistage lors du premier traitement.
- Dépistage continu aux deux semaines.

Si l'utilisateur obtient un résultat positif du test, il sera dirigé en zone tiède ou chaude, selon la trajectoire établie de l'hôpital. L'utilisateur pourrait se voir attribuer un horaire atypique dans le suivi de ses traitements pendant cette période.

Usagers en oncologie

- Dépistage avant le début d'un nouveau traitement en salle
- Dépistage lors de la reprise d'un traitement après plus de 6 semaines d'arrêt

Si l'utilisateur s'avère positif à la Covid-19 et n'est pas immunosupprimé : report du traitement pour un minimum de 14 jours avec la disparition des symptômes de fièvre, toux depuis minimum 48 h.

Si l'utilisateur s'avère positif à la Covid-19 et est immunosupprimé : report du traitement pour une période 28 jours afin de diminuer les risques de complication. Attendre la disparition des symptômes de fièvre et de toux depuis minimum 48 h. Une évaluation médicale doit être faite vers le 28e jour pour la reprise de traitement.