

DESTINATAIRE (S) : Gestionnaires des programmes de médecine, chirurgie, soins critiques, lutte contre le cancer, SAPA, logistique, coordonnateurs d'activités hospitalières, gestions des lits, médecins, admission – Saint-Jérôme

EXPÉDITRICE : Service de prévention et contrôle des infections (PCI) de Saint-Jérôme

DATE : 14 novembre 2020

OBJET : **MAJ REHAUSSEMENT DU DÉPISTAGE À L'ARRIVÉE D'UN USAGER - HÔPITAL DE SAINT-JÉRÔME.**

Suite à la découverte de plusieurs cas positifs de la COVID-19 par acquisition communautaire dans nos établissements ces deux dernières semaines, de la transmission soutenue en communauté et de l'apparition de symptômes atypiques ou même inexistantes chez nos usagers, un rehaussement des mesures de dépistage doit être mis en place rapidement.

Voici les mesures supplémentaires à instaurer dès maintenant auprès des usagers de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.

Usagers froids (vert)

- Dépistage dès leur arrivée au jour 0 comme à l'habitude. (Pour les pré-op, le jour 0 étant considéré comme un test négatif dans les 48 h précédant l'admission), Appliquer les précautions additionnelles « **Gouttelettes contact +** » jusqu'à l'obtention du résultat COVID-19 du jour 0;
- Pour les usagers de **l'urgence**, en **préopératoire** ainsi que les **transferts interétablissements**, deuxième dépistage **au jour 5** de leur présence dans l'hôpital;
- **Aucun délai requis pour l'admission à l'étage dans l'attente du résultat de COVID-19 du jour 0. L'utilisateur sera isolé sur place dans une chambre privée ou multiple dans l'attente du 1^{er} résultat négatif.**

Usagers tièdes (jaune)

- Dépistage dès leur arrivée au jour 0, comme à l'habitude;
- Deuxième dépistage **au jour 5** de leur présence dans l'hôpital;
- Précaution additionnelle **jusqu'à l'obtention des 2 résultats négatifs**. Cesser suite à une validation avec l'équipe de PCI ou la microbiologie de garde;
- **Localisation de ces usagers en zones tièdes : à l'UHB ou dans la nouvelle zone tiède située au 3^eD.**

Usagers avec symptômes respiratoires

Pour tout usager présentant des symptômes respiratoires qui pourraient s'apparenter à la COVID-19 ou avec des diagnostics tels que MPOC exacerbé ou pneumonie, mettre en précautions additionnelles jusqu'à l'obtention de 2 résultats COVID-19 négatifs et cesser suite à une validation avec l'équipe de PCI ou la microbiologie de garde.