

DESTINATAIRE : Aux gestionnaires, au personnel infirmier et au personnel transfuseur des centres hospitaliers du CISSS des Laurentides

EXPÉDITEUR : Dre Marie-Claude Lessard hémato-oncologue

DATE : Le jeudi, 19 novembre 2020

OBJET : **Covid-19 - Rappel des bonnes pratiques en médecine transfusionnelle en zones chaude, tiède et unités de soins en éclosion**

Afin d'assurer la sécurité de tous, il est important de bien respecter les recommandations suivantes concernant les produits sanguins :

DISTRIBUTION DU PRODUIT SANGUIN PAR LA BANQUE DE SANG

Placer le produit sanguin dans un sac refermable.

Placer dans un second sac dans lequel sera glissé le bordereau de distribution (entre le 1^{er} et le 2^e sac).

VÉRIFICATIONS PRÉTRANSFUSIONNELLES

Retirer le bordereau qui se trouve entre les deux sacs. Laisser le produit dans les deux sacs.

Vérifier la concordance entre l'ordonnance médicale, le bordereau et le produit sanguin.

Confier le bordereau au 2^e vérificateur qui reste à l'extérieur de la chambre et apporter le produit sanguin, qui est toujours dans les deux sacs, à l'intérieur de la chambre.

Retirer le sac externe et le déposer loin du receveur, dans un endroit propre.

Au chevet du receveur, vérifier son identité avec le bracelet et faire la concordance avec l'étiquette du produit. La concordance avec le bordereau est faite de façon verbale avec le 2^e vérificateur qui est resté à l'extérieur de la chambre. Ce dernier remplit le bordereau et signe pour le transfuseur « 'au nom de »'.

DISPOSITION DU SAC DE PRODUITS SANGUINS VIDE

Les sacs de produits sanguins vides ne doivent pas quitter la zone contaminée.

Conserver le sac de produits sanguins vides pour un minimum de 4 heures à température pièce (pourrait être requis au laboratoire advenant une réaction transfusionnelle).

Désinfecter le sac vide et le placer dans un sac refermable propre (prévoir un espace dans la zone contaminée pour conserver le produit), une fois les 4 heures dépassées, éliminer le produit sur l'unité de soins en le jetant dans un contenant *Biorisque*.

Si le produit doit retourner au laboratoire, désinfecter le sac externe et le placer dans un 2^e sac refermable propre.

DISPOSITION DU COUPON DE CONFIRMATION DE LA TRANSFUSION

Si le coupon de transfusion n'est pas entré dans la zone contaminée, il peut être retourné au laboratoire.

Si entré en zone contaminée : Placer le coupon dans un sac refermable propre et désinfecter l'extérieur du sac avant de le retourner au laboratoire.

RETOUR À LA BANQUE DE SANG D'UN PRODUIT NON ADMINISTRÉ

Si le produit sanguin n'est pas administré et toujours dans le premier sac, désinfecter l'extérieur du sac. Le mettre dans un second sac propre à l'extérieur de la zone contaminée et le retourner à la banque de sang.

Si le produit sanguin a été sorti des deux sacs en zone contaminée, vérifier avec la banque de sang si ce dernier doit être retourné ou jeté directement sur l'unité de soins.

En tout temps, avant de jeter un produit sanguin, vous devez en aviser la banque de sang afin d'assurer une traçabilité de ces derniers.



Dre Marie-Claude Lessard

Hémato-Oncologue et Directrice régionale de la banque de sang CISSS des Laurentides