INFORMATION SUR LES VACCINS ANTIGRIPPAUX DISTRIBUÉS AU QUÉBEC – SAISON 2019-2020

VACCIN QUADRIVALENT	Programme d'immunisation contre l'influenza (PIIQ) – vaccination GRATUITE			Vaccination PAYANTE (hors PIIQ)
	Afluria Tetra *(Seqirus)*	**Flulaval Tetra** *(GSK)*	**Fluzone Quadrivalent** *(Sanofi Pasteur)*	**Influvac Tetra** *(BGP Pharma ULC)*
Type de vaccin	Inactivé, virions fragmentés	Inactivé, virions fragmentés	Inactivé, virions fragmentés	Inactivé, sous unitaire
Posologie et voie d'administration	0,5 ml IM	0,5 ml IM	0,5 ml IM	0,5 ml IM
Âge homologué	5 ans et plus	6 mois et plus	6 mois et plus	18 ans et plus
Clientèle ciblée par le PIIQ	**Résidents en CHSLD** **Usagers (5 ans et plus) en centres hospitaliers** (indications du PIQ) Disponible également sur le marché privé	Personnes âgées de 6 mois et plus décrites dans les indications du PIQ	Personnes âgées de 6 mois et plus décrites dans les indications du PIQ Disponible également sur le marché privé	Non applicable, marché privé
Contre-indication	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)
Précaution	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave
Présentation	Seringue de 0,5 ml (PIIQ) Fiole multidose de 5 ml	Fiole multidose de 5 ml	Fiole multidose de 5 ml Seringue de 0,5 ml	Seringue de 0,5 ml
Durée de conservation	28 jours suivant sa date d'ouverture (fiole seulement)	28 jours suivant sa date d'ouverture	Jusqu'à la date de péremption	Non applicable
Adjuvant	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
Thimérosal	Oui, (fiole de 5 ml)	50 µg/dose	50 µg/dose (fiole de 5 ml)	Non
Trace d'antibiotique	Néomycine, polymyxine B	Aucune trace	Aucune trace	Gentamicine, néomycine, polymixine B
Autre ingrédient (présence en état de trace ou en quantité résiduelle)	Protéines d'œuf, taurodéoxycholate de sodium, bêta-propiolactone, saccharose, chlorure de calcium, l'hydrogénophosphate de disodium (anhydre), dihydrogénophosphate de potassium, dihydrogénophosphate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de sodium	Protéines d'œuf, polysorbate 80, hydrogénosuccinate d'α-tocophérol, formaldéhyde, sucrose, éthanol, désoxycholate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate de disodium heptahydraté, phosphate de sodium dihydraté	Protéines d'œuf, Triton X-100, formaldéhyde, chlorure de sodium isotonique tamponné au phosphate de sodium	Protéines d'œuf, chlorure de calcium déshydraté, phosphate disodique déshydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de potassium, phosphate monobasique de potassium, chlorure de sodium, bromure de cétyltriméthylammonium, protéines de poulet, formaldéhyde, hydrocortisone, polysorbate 80, citrate de sodium, saccharose, tartrate de tylosine
Latex naturel	Absence	Absence	Absence	Absence

Le vaccin **FluMist Quadrivalent** n'est pas disponible au Canada pour la saison 2019-2020.

Légende :
SGB : Syndrome de Guillain-Barré
SOR : Syndrome oculo-respiratoire
AAS : Acide acétylsalicylique

Adapté de : ASPC, *Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2019-2020, Annexe A ; Caractéristiques des vaccins antigrippaux offerts au Canada*, 2019-2020.

INFORMATION SUR LES VACCINS ANTIGRIPPAUX DISTRIBUÉS AU QUÉBEC – SAISON 2019-2020

VACCIN TRIVALENT	Vaccination PAYANTE (marché privé, hors PIIQ)				
	Agriflu (Seqirus)	**Fluad Pédiatrique** (Seqirus)	**Fluad** *(Seqirus)*	**Fluviral** *(GSK)*	**Fluzone Haute dose** *(Sanofi Pasteur)*
Type de vaccin	Inactivé, sous unitaire	Inactivé, sous unitaire	Inactivé, sous unitaire	Inactivé, virions fragmentés	Inactivé, virions fragmentés
Posologie et voie d'administration	0,5 ml IM	0,25 ml IM	0,5 ml IM	0,5 ml IM	0,5 ml IM
Âge homologué	6 mois et plus	6 à 23 mois	65 ans et plus	6 mois et plus	65 ans et plus
Clientèle ciblée par le PIIQ	Non applicable, marché privé	Non applicable, marché privé	Non applicable, marché privé	Non applicable, marché privé	Non applicable, marché privé
Contre-indication	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)
Précaution	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave
Présentation	Fiole multidose de 5 ml Seringue de 0,5 ml	Seringue de 0,25 ml	Seringue de 0,5 ml	Fiole multidose de 5 ml	Seringue de 0,5 ml
Durée de conservation	28 jours suivant la date d'ouverture (fiole seulement)	Non applicable	Non applicable	28 jours suivant sa date d'ouverture	Non applicable
Adjuvant	Aucun	MF59C.1 Contient du squalène, du polysorbate 80, du trioléate de sorbitan, du citrate de sodium et de l'acide citrique	MF59C.1 Contient du squalène, du polysorbate 80, du trioléate de sorbitan, du citrate de sodium et de l'acide citrique	Aucun	Aucun
Thimérosal	50 µg/dose (fiole 5 ml)	Non	Non	50 µg/dose	Non
Trace d'antibiotique	Néomycine, kanamycine	Kanamycine, néomycine	Kanamycine, néomycine	Aucune trace	Aucune trace
Autre ingrédient (présence en état de trace ou en quantité résiduelle)	Protéines d'œuf, hydrocortisone, formaldéhyde, bromure d'hexadécyltriméthylammonium, polysorbate 80, baryum, citrates, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate acide de potassium, phosphate disodique dihydraté, chlorure de calcium dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté	Protéines d'œuf, hydrocortisone, formaldéhyde, bromure d'hexadécyltriméthylammonium, baryum, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate acide de potassium, phosphate disodique dihydraté, dichlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de calcium dihydraté	Protéines d'œuf, hydrocortisone, formaldéhyde, bromure d'hexadécyltriméthylammonium, baryum, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate acide de potassium, phosphate disodique dihydraté, dichlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de calcium dihydraté	Protéines d'œuf, polysorbate 80, hydrogénosuccinate d'α-tocophérol, sucrose, éthanol, formaldéhyde, désoxycholate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate de sodium heptahydraté, phosphate de sodium dihydraté	Protéines d'œuf, Triton X-100, formaldéhyde, chlorure de sodium isotonique tamponné au phosphate de sodium
Latex naturel	Absence	Absence	Absence	Absence	Absence

Légende :

SGB : Syndrome de Guillain-Barré
SOR : Syndrome oculo-respiratoire
AAS : Acide acétylsalicylique

Adapté de : ASPC, *Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2019-2020, Annexe A ; Caractéristiques des vaccins antigrippaux offerts au Canada*, 2019-2020.