

Probabilité clinique de thrombose veineuse profonde selon le score de Wells

Paramètres cliniques scores

➤ Cancer évolutif au cours des six derniers mois (traitement actif ou palliatif)	1
➤ Paralysie ,parésie ou immobilisation récente (par un plâtre) des membres inférieurs	1
➤ Alitement récent de plus de 3 jours ou intervention chirurgicale importante dans les 4 dernières semaines	1
➤ Douleur à la pression sur le trajet du système veineux profond	1
➤ Œdème de tout le membre inférieur	1
➤ Gonflement du mollet de plus de 3 cm par rapport au membre sain	
➤ (mesuré 10 cm sous la tubérosité tibiale)	1
➤ Œdème à godet (plus important au niveau du membre atteint)	1
➤ Veines collatérales superficielles (non variqueuses)	1
➤ Autre diagnostic aussi ou plus probable que celui d'une thrombophlébite profonde	-2

Liste des diagnostics différentiels de la TPP (aide mémoire)

- a. Étirement et déchirure musculaire
- b. Lymphangite-obstruction lymphatique
- c. Insuffisance veineuse chronique-varicosité
- d. Kyste de Baker
- e. Cellulite
- f. Affections au genou
- g. Atteinte artérielle

Score

- Probabilité modérée à élevée : 2 ou plus
- Probabilité faible : ≤ à 1