

Soins à apporter à mon cathéter

- Ne jamais tirer sur le cathéter.
- Laisser le pansement et les bouchons aux extrémités du cathéter en place.
- S'assurer que le cathéter est utilisé uniquement pour l'hémodialyse et par du personnel soignant formé.
- Maintenir tout objet coupant (ex. : ciseaux, rasoirs, etc.) loin du cathéter.

Surveillance



- Observer ce que fait l'infirmière durant les soins. Si vous remarquez un changement dans la routine, dites-le.
- Informer l'Unité d'hémodialyse immédiatement si le site saigne.

Prévention des infections

- Porter un masque couvrant le nez et la bouche quand l'infirmière s'occupe du cathéter.
- Pas de baignade (piscine, lac, spa, etc.), car celle-ci peut causer une infection.

Centre d'hémodialyse de Saint-Jérôme
Téléphone : 450 432-2777, poste 22191, option 1
Du lundi au samedi, de 7 h 15 à 23 h 30

Centre de services ambulatoires de Saint-Jérôme
Téléphone : 450 432-2777, poste 22191, option 2
Du lundi au samedi, de 7 h 15 à 23 h 30

Centre d'hémodialyse de Saint-Eustache
Téléphone: 450 473-6811, poste 47601
Du lundi au samedi, de 7 h 15 à 23 h 30

Centre d'hémodialyse de Rivière-Rouge
Téléphone: 819 275-2118, poste 53770
Du lundi au samedi, de 7 h 15 à 19 h

Direction adjointe aux pratiques professionnelles (DAPP)



www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/insuffisance-renale/

Sources des images :

1. BD Interventional. Avec l'autorisation de Becton, Dickinson and Company. À titre indicatif seulement.
 2. Miller LM, Clark E, Dipchand C, Hiremath S, Kappel J, Kiai M, Lok C, Luscombe R, Moist L, Oliver M, MacRae J et Canadian Society of Nephrology Vascular Access Work Group. (2016, 27 septembre). Hemodialysis Tunneled Catheter-Related Infections. *Canadian Journal of Kidney Health and Disease*, 3. DOI : 10.1177/2054358116669129
- Autre image et pictogrammes : Pexels.

**Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides**

Québec

Mon cathéter d'hémodialyse : les surveillances et les soins essentiels



Source de l'image : 1

Communications - Novembre 2025

**Dépliant d'information à l'intention
des usagers et de leurs proches**

Québec

Risques associés au port d'un cathéter pour mes traitements d'hémodialyse

- Blocage (obstruction) causé par un caillot de sang.
- Thrombose (blocage de la veine portant le cathéter par un caillot de sang).
- Infection de la peau causée par des microbes entrés dans le cathéter ou sous le pansement.



Source des images : 2

Est-ce que le risque d'infection est élevé?

Le risque d'infection est élevé et peut être très grave. L'infection peut nécessiter le changement du cathéter, la prise d'antibiotiques, l'hospitalisation et, dans certains cas, un séjour aux soins intensifs.

Signes d'une infection de cathéter

- Écoulement de liquide, rougeur, douleur ou enflure près de la sortie du cathéter.
- Frissons, sueurs intenses ou fièvre.



Attention!

Si vous présentez un ou plusieurs de ces signes, appelez l'Unité d'hémodialyse rapidement.

Prendre soin de mon cathéter

Vous avez un rôle très important à jouer dans la prévention des infections de cathéter.

Hygiène des mains

- Lavez-vous les mains en arrivant et en quittant l'Unité d'hémodialyse.
- Ne touchez pas au cathéter. Si vous devez le faire, lavez-vous les mains avant.



Pansement

- Gardez le pansement propre et sec. Prenez un bain au lieu d'une douche.
- Si le pansement se mouille, prévenez l'Unité d'hémodialyse.
- La transpiration peut faire décoller le pansement.
- Vérifiez le pansement chaque jour :
 - Si le pansement est légèrement décollé, mais que le site de sortie du cathéter demeure bien couvert, utilisez le matériel fourni par l'Unité d'hémodialyse pour le consolider.
 - Si le pansement est trop décollé, c'est-à-dire que le site de sortie du cathéter est à l'air libre, communiquez avec l'Unité d'hémodialyse rapidement.