Si vous avez des questions sur votre état de santé à la suite de votre examen, communiquez avec le service d'électrophysiologie médicale. (du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h)

Pour Saint-Jérôme :
450 432-2777, poste 22211

Pour Saint-Eustache :
450 473-6811, poste 42143

Notes:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Hôpital régional de Saint-Jérôme
290, rue De Montigny
Saint-Jérôme ,Qc J7Z 5T3

Hôpital de Saint-Eustache
520, boulevard Arthur-Sauvé
Saint-Eustache, Qc J7R 5B1

Département d'électrophysiologie médicale
Direction des services multidisciplinaires,
de l'enseignement et de la recherche (DSMER)

Validé par :
Dr Serge Mcnicoll, cardiologue
Dr Pierre-Louis Bernard, cardiologue
Dre Maude Limoges, cardiologue
Anne-Marie Larose, conseillère-cadre en soins infirmiers, Direction des soins infirmiers
Marjolaine Lajoie, Conseillère-cadre aux pratiques professionnelles, DSMER

Références:

- Image du Web, association des cardiologues de Genève
- Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, échographie trans-oesophagienne
- Institut universitaire de cardiologie de Montréal
- Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec

www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Communications - Mai 2022

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides
Québec

PLUS DE 100 INSTALLATIONS EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

LE **CISSS** DES LAURENTIDES
complice de votre santé

L'échographie cardiaque trans-oesophagienne



Dépliant d'information à l'intention des usagers et de leurs proches

Québec

L'échographie cardiaque trans-oesophagienne

L'échocardiographie trans-œsophagienne (ETO) est un test d'imagerie qui permet de visualiser le cœur et ses structures environnantes. Pour ce faire, une sonde d'échographie est introduite par la bouche, puis descendue dans l'œsophage.

C'est le cardiologue qui réalisera l'examen d'une durée moyenne de 15 minutes.

Si vous avez des prothèses dentaires, on vous demandera de les retirer le temps de l'examen.

Une anesthésie locale de la gorge sera effectuée pour réduire l'inconfort.

Cet examen peut nécessiter l'administration d'un sédatif pour vous aider à relaxer. Dans ce cas, un cathéter intraveineux (petit tube flexible) vous sera installé.

Une surveillance de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque ainsi que du taux d'oxygène sera effectuée avant, pendant et après l'examen.

Vous aurez à signer un formulaire de consentement au préalable.



Préparation pour l'examen

pour les usagers qui ne sont pas hospitalisés

- Si votre examen est le matin, vous devez **être à jeun depuis minuit** la veille de l'examen (sans boire ni manger).
- Si votre examen est en après-midi, vous devez **être à jeun depuis 6 h le matin** (sans boire ni manger).
- Vous pouvez prendre vos **médicaments avec un peu d'eau**.
- Vous devez arriver **30 minutes à l'avance**.
- Vous devez obligatoirement être **accompagné d'un adulte.**
- Vous devez apporter une **liste à jour** de vos médicaments.
- Vous devez apporter votre **carte** de l'hôpital ainsi que votre **carte d'assurance maladie valide**.
- Si vous pensez être **enceinte**, informez le professionnel de la santé avant qu'un médicament ne vous soit administré.

Indications à la suite de votre examen

- À la suite de votre examen, une surveillance des signes vitaux sera effectuée jusqu'à ce qu'un professionnel vous autorisent à quitter, dans la mesure où vous devez retourner à votre domicile (environ 30 minutes).
- Si vous recevez un sédatif, veuillez **ne pas conduire pour une période de 24 heures** suivant l'examen et évitez de signer des documents officiels. De plus, évitez de boire de l'alcool ou autres dépresseurs du système nerveux central (ex. : drogue).
- **Veuillez ne pas boire ni manger deux heures suivant** votre examen, pour éviter de vous étouffer.
- Débutez par boire de l'eau, puis si vous n'éprouvez pas d'inconfort, passez aux solides.
- Évitez les aliments ou breuvages très chauds qui pourraient irriter la gorge.

Effets secondaires possibles

- L'administration d'un sédatif peut provoquer de la somnolence ou des étourdissements.
- Il n'est pas inhabituel de rester avec une certaine sensibilité à la gorge. Cet inconfort se résorbe habituellement dans les 24 heures suivant l'examen.