

Pratique Organisationnelle Requise
Abréviations, symboles et inscriptions dangereuses
à NE PAS utiliser

Les abréviations, symboles et inscriptions numériques retrouvées dans la colonne de gauche ont été impliqués dans des accidents graves liés à la médication. Ils ne devraient JAMAIS être utilisés lors de la communication d'informations liées à la médication. **Réf Abréviations Dangereuses ISMP 2006**

NE JAMAIS UTILISER	CORRECTIONS
Abréviations du nom des médicaments et des vaccins	Écrire au long tous les noms des médicaments et des vaccins
AC	Écrire « Avant repas » ou « Analyse et culture »
AD, AS, AU	Utiliser « oreille droite », « oreille gauche » et « les deux oreilles »
OD	Écrire « Par jour » ou « DIE »
OD, OS, OU	Utiliser « œil droit », « œil gauche » et « les deux yeux »
CC, cc	Utiliser « millilitres » ou « avec repas »
D/C	Utiliser « Cesser » ou « Congé »
D5, D10	Écrire « Dextrose 5 % » ou « Dextrose 10 % »
Jours de la semaine (L,M,M,J,V,S,D)	Écrire au long ou utiliser les trois premières lettres du jour
NS, SP	Utiliser NaCl 0.9%
QD	Écrire « Par jour » ou « DIE »
QOD	Écrire « un jour sur deux »
SC ou SL	Écrire au long ou utiliser « S.cut. » ou « S.Ling »
U, UI	Utiliser « Unités »
µg	Utiliser « mcg »
@	Utiliser « à »
> ≥	Écrire « plus grand que » ou « supérieur ou égal à »
< ≤	Écrire « plus petit que » ou « inférieur ou égal à »
∅	Écrire « ne pas » ou « aucun »
+	Écrire « plus » ou « positif »
Zéro à droite du point (1.0 mg)	Ne jamais inscrire un zéro à droite du point Inscrire « 1 mg »
Manque un zéro à gauche du point (.5 mg)	Toujours inscrire un zéro à gauche du point Inscrire « 0.5 mg »
Pas d'espace après le nom, la dose. « Inderal40mg »	Utiliser un espace entre le nom et la dose d'un médicament « Inderal 40 mg »
Pas d'espaces entre les unités (Pénicilline 100000 unités)	Utiliser un espace pour les doses supérieures à 1000 (Pénicilline 100 000) ou utiliser le mot « million »