Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Laurentides
Québec

Note de service

DESTINATAIRES :	Tout le personnel et les bénévoles du CISSS des Laurentides
EXPÉDITEURS :	Fanny Laverdure, conseillère cadre en soins infirmiers Service de prévention et contrôle des infections Sébastien Duvergé, chef de service, Prévention et mieux-être au travail Sophie Perras, chef de service intérimaire, Soutien RH à la gestion des maladies infectieuses
DATE :	Le 22 décembre 2022
OBJETS :	**MISE À JOUR : Gestion des cas d'infection respiratoire aiguë/gastroentérite virale et gestion des horaires**

La saison virale étant officiellement débutée, nous désirons vous rappeler de demeurer vigilant considérant la symptomatologie similaire de l'influenza et de la gastroentérite virale avec celle de la COVID-19.

Les principaux symptômes, ainsi que les responsabilités pour les employés, bénévoles, de même que les gestionnaires figurent au tableau ci-après.

À l'instar de la COVID-19, nous vous rappelons que la prévention de l'influenza et de la gastroentérite virale débute par de simples mesures :

- Pratiquer rigoureusement l'hygiène des mains.
- Porter un masque en présence de personnes présentant des symptômes de SAG ou d'infection respiratoire, ou si vous présentez des symptômes respiratoires.
- Lien utile : https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/covid-19-employes/depistage-du-personnel/depistage-dun-travailleur-de-la-sante/

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

LE **CISSS** DES LAURENTIDES
complice de votre santé

Téléphone : 450 432-2777
www.santelaurentides.gouv.qc.ca

<table>
<tr><th>SYMPTÔMES</th><th>EMPLOYÉ</th><th>GESTIONNAIRE</th><th>CODE HORAIRE À UTILISER</th></tr>
<tr><td>COVID-19

Groupe A : Présence d’<u>un</u> symptôme :
➢ Fièvre (38,1 °C et plus (buccale))
➢ Anosmie soudaine (sans congestion nasale) ou agueusie ou dysgueusie
➢ Toux (nouvelle ou aggravée)
➢ Essoufflement
➢ Difficulté à respirer
➢ Mal de gorge
Groupe B : Présence d’au moins <u>deux</u> symptômes :
➢ Céphalée
➢ Fatigue intense
➢ Douleur musculaire généralisée (sans effort physique)
➢ Perte d’appétit importante
➢ Nausée ou vomissements
➢ Douleur abdominale
➢ Diarrhée
➢ Congestion nasale/rhinorrhée de cause inconnue</td><td rowspan="2">➢ Dépistage COVID-19 dès l’apparition des symptômes.

➢ Référez-vous à la section des travailleurs ayant des symptômes s’apparentant à la COVID-19 du tableau Gestion des travailleurs de la santé exposés ou diagnostiqués positifs à la COVID-19 pour la suite.</td><td rowspan="3">➢ Gestion des absences courte durée en lien avec la COVID-19, l’influenza et la gastroentérite virale.</td><td rowspan="3">M (maladie)

Quand la maladie est acquise à l’extérieur du lieu de travail <u>ou si l’unité n’est pas déclarée en éclosion</u>.

ECL (éclosion)

Lorsque la maladie est acquise à la suite d’un quart de travail sur une unité en éclosion.

COV19

Lors de la journée ou des heures requises pour le dépistage.</td></tr>
<tr><td>SYNDROME D’ALLURE GRIPPALE (SAG)
(CAS CLINIQUE D’INFECTION RESPIRATOIRE AIGUË[1])

Apparition soudaine de fièvre ET de toux ET d’au moins un des symptômes suivants :

➢ Mal de gorge
➢ Mal de tête
➢ Douleur musculaire
➢ Douleur articulaire
➢ Détérioration de l’état cognitif et/ou physique
➢ Fatigue extrême</td></tr>
<tr><td>GASTROENTÉRITE VIRALE

Apparition soudaine de 2 vomissements en 24 h OU
2 selles molles ou liquides de plus que la normale en 24 h ET au moins un symptôme des symptômes suivants :
➢ Fièvre
➢ Douleurs ou crampes abdominales
➢ Mal de tête
➢ Nausées</td><td>➢ Dépistage COVID-19 dès que son état le permet.

➢ Attendre 48 heures après la fin des symptômes pour retourner au travail.

➢ Obtention d’un résultat négatif à la COVID-19 avant le retour au travail.</td></tr>
</table>

[1] **L’influenza** peut se manifester de façon atypique par l’absence de fièvre et l’arrivée tardive de la toux, particulièrement auprès des personnes âgées.