



# Je m'INForme

Journal des pratiques professionnelles en soins infirmiers  
Février 2024



## LE CANCER COLORECTAL



**Laura**  
Infirmière

Allo, un de mes usagers de 62 ans voulait que je le rassure concernant les risques pour ses enfants de développer un cancer colorectal (comme lui). N'ayant pas une très grande connaissance sur le sujet, je ne me sentais pas très compétente pour lui répondre. 😊

Je lui ai simplement dit qu'il y avait assurément un potentiel de risque génétique, mais qu'il serait préférable qu'il en parle avec son médecin. Est-ce que j'aurais pu le guider autrement?

Allo! Tu as bien fait de m'écrire. Comme tu n'étais pas certaine de la réponse, c'est correct de le référer à un professionnel qui pourra répondre à sa question.

Pour la prochaine fois, savais-tu que dans certains secteurs, l'infirmière peut initier le dépistage du cancer colorectal, selon certains critères.

Je ne savais pas! Je pensais que c'était les médecins qui le pouvaient.

Dans certains secteurs comme les centres de dépistage, le GAP et les GMF, les infirmières appliquent un protocole, afin de dépister les usagers à risque.

Tu peux te référer au protocole médical national # 830054 (disponible sur internet), élaboré par l'INESSS, pour en savoir plus.

Eh bien, je ne savais pas que certaines infirmières possédaient ces connaissances et dépistaient elles-mêmes les usagers. Je vais aller lire ça, c'est certain! Merci pour ton support. 😊

Ça me fait plaisir! 😊



**Éric**  
Conseiller  
en soins

### Savais-tu que...

- Le cancer colorectal (CCR) est la deuxième cause de mortalité par cancer au Québec, après le cancer du poumon.
- Détecter à un stade précoce, ce cancer peut être traité et guéri. Le taux de survie à 5 ans approchant 90 %.

### Objectif du programme de dépistage

- Réduire la mortalité associée au CCR, grâce à la détection :
  - de polypes précancéreux;
  - ou
  - d'un cancer à un stade précoce.

### Niveau de risque

Niveau de risque	Critères	
	Âge	Antécédent familial de CCR
Moyen	50 à 74 ans	Aucun
Légèrement accru	40 à 74 ans	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un parent de 1<sup>er</sup> degré auquel on a diagnostiqué un CCR à ou après 60 ans;</li> <li>- Un parent de 2<sup>e</sup> ou de 3<sup>e</sup> degré auquel on a diagnostiqué un CCR, quel que soit son âge;</li> <li>- Deux parents de 2<sup>e</sup> degré auxquels on a diagnostiqué un CCR, quel que soit leur âge.</li> </ul>
Modérément accru	40* à 74 ans *ou 10 ans avant le plus jeune âge de diagnostic de CCR dans la famille	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un parent de 1<sup>er</sup> degré auquel on a diagnostiqué un CCR avant l'âge de 60 ans;</li> <li>- Deux parents de 1<sup>er</sup> degré auxquels on a diagnostiqué un CCR, quel que soit leur âge;</li> <li>- Un parent de 1<sup>er</sup> degré et un parent de 2<sup>e</sup> degré du même côté de la famille auxquels on a diagnostiqué un CCR, quel que soit leur âge.</li> </ul>

Source : INESSS. (2023) Protocole médical national [Initier un test immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles ou demander une coloscopie dans le cadre du dépistage du cancer colorectal](#)

Scannez le code QR afin de tester vos connaissances.



Pour plus d'information,  
se référer aux conseillères ou conseillers en soins infirmiers.

Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
des Laurentides

Québec