

## Mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) RI-RPA : Gastro-entérite

UNITÉ DE SOINS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Unité de soins en RPA</li> <li>➤ RI-SAPA</li> </ul>	
HORS UNITÉ DE SOINS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Milieu de vie en RPA</li> </ul>	
SYMPTÔMES ET CONTAGIOSITÉ	
<b>Symptôme clinique compatible avec la gastro-entérite</b>	<p>Apparition soudaine en 24 h d'au moins :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2 épisodes de vomissements OU</li> <li>➤ 2 épisodes de selles molles ou liquides de plus que ce qui est considéré comme normal pour le résident ET</li> </ul> <p>Au moins un symptôme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fièvre</li> <li>➤ Nausée</li> <li>➤ Crampes abdominales</li> <li>➤ Mal de tête</li> </ul>
<b>Période de contagiosité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dès l'apparition des symptômes jusqu'à 48 h après la fin des symptômes</li> </ul>
PRISE EN CHARGE D'UNE PERSONNE SYMPTÔMATIQUE	
<b>Dépistage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tester pour COVID-19, si symptômes compatibles</li> <li>Si suspicion de COVID-19, appliquer les précautions additionnelles pour COVID-19 (masque type N-95, protection oculaire, jaquettes, gants)</li> </ul>
<b>Unité de soins ET Hors unité de soins</b>	<p>Garder le résident à sa chambre avec les précautions additionnelles gouttelettes-contact (masque médical, jaquette et gants)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Maintenir l'isolement jusqu'à 48 h après la fin des symptômes</li> </ul>
<b>Retrait du travail Travailleur ET Manipulateur d'aliments</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Retirer immédiatement tout travailleur et manipulateur d'aliment malade <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jusqu'à 48 h après la fin des symptômes</li> </ul> </li> </ul>
<b>Contacts étroits</b>	<p><b>Unité de soins :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Co-chambreurs et personnes qui ont partagé la même toilette <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Isolement gouttelettes-contact à la chambre pour 48 h après le dernier contact avec le cas de gastro-entérite</li> <li>○ Surveillance des symptômes pour 48 h</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>Hors unité de soins :</b> Aucune mesure pour les contacts étroits</p>

## Mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) RI-RPA : Gastro-entérite

<b>MILIEU EN ÉCLOSION</b>	
<b>Deux résidents ou plus dans l'unité de soins, la résidence ou secteur à l'intérieur de 48 h</b>	
<b>Communication</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informer l'ensemble du personnel, les résidents, les familles et visiteurs de l'état de situation et des mesures qui seront en place</li> <li>➤ Afficher à l'entrée du milieu de vie qu'une éclosion est en cours</li> <li>➤ Lors d'un transfert de résident, aviser le centre receveur que le milieu est en éclosion</li> <li>➤ Sensibiliser les résidents à faire l'auto-surveillance des symptômes</li> <li>➤ Le personnel doit rester à l'affût des symptômes pour les résidents des unités de soins</li> <li>➤ Rencontrer le personnel</li> <li>➤ Dresser un portrait de la situation</li> <li>➤ Rappeler l'importance de l'hygiène des mains</li> <li>➤ Rappeler les symptômes de gastro-entérite</li> <li>➤ Rappeler l'importance de respecter les procédures de désinfection des petits équipements mobiles partagés et des surfaces de travail (ex. : chariot à médicament, ordinateur, téléphone, presse-pilule, espace de travail)</li> </ul>
<b>Mesures de prévention et contrôle des infections</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Surveiller les symptômes de tous les résidents et travailleurs</li> <li>➤ Renforcer l'hygiène des mains avec solution hydro-alcoolique à 70 % ou avec de l'eau et du savon               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Demander aux résidents de procéder à l'hygiène des mains avant les repas, les collations et après être allé à la toilette</li> </ul> </li> <li>➤ Dédier une toilette aux personnes malades ou fournir une chaise d'aisance, favoriser l'utilisation des sacs hygiéniques</li> <li>➤ Si possible, encourager les résidents à utiliser leur salle de bains personnelle</li> <li>➤ Nettoyer et désinfecter les salles de bains partagées plusieurs fois par jour</li> </ul> <p>Mobilité des travailleurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Restreindre la circulation dans l'unité ou secteur en éclosion aux TdeS requis pour les soins</li> <li>➤ Assurer la stabilité des TdeS sur l'unité/secteur en éclosion</li> <li>➤ Si les TdeS ne peuvent être dédiés, terminer par les soins aux résidents sur l'unité en éclosion</li> </ul>
<b>Salle à manger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Favoriser hygiène des mains avant les repas et collations</li> <li>➤ Offrir l'option du service de livraison des repas à l'appartement/chambre pour réduire l'achalandage à la salle à manger</li> <li>➤ Éviter le partage de nourriture ou le matériel partagé sur la tables repas (ex. : salières, poivrières, bac d'ustensiles, etc.)</li> <li>➤ Envisager de nettoyer et désinfecter les réfrigérateurs communs des unités touchées</li> <li>➤ Éviter de récupérer les aliments non consommés fournis</li> </ul>
<b>Aires communes ET Activités sociales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cesser les activités de groupe</li> <li>➤ Reporter les visites porte ouverte du milieu</li> <li>➤ Ajouter des distributrices de solution hydro-alcoolique dans les espaces communs avec affiches plastifiées</li> <li>➤ Privilégier les procédures thérapeutiques à la chambre si possible</li> </ul>

## Mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) RI-RPA : Gastro-entérite

<b>Nettoyage et désinfection</b>	<p>Mettre en place une fréquence de nettoyage et de désinfection des surfaces fréquemment touchées (<i>high touch</i>) dans les aires communes qui est supérieure à une fois par jour (plurifréquence).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Utiliser le guide <a href="#">Hygiène et salubrité dans les milieux de vie RPA, RI et CHSLD</a></li> <li>➤ Établir des routes de travail afin d'augmenter les fréquences de nettoyage et de désinfection :             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Avoir une liste des <i>high touch</i> à nettoyer</li> <li>○ Utiliser un produit virucide et homologué (numéro DIN) par Santé Canada en respectant le temps de contact humide des produits utilisés</li> <li>○ Désinfecter les équipements/matériels de soins si utilisés</li> <li>○ Porter une attention particulière aux salles de bains partagées</li> <li>○ Changement de literie 1 fois/jour pour les usagers symptomatiques en unité de soins</li> </ul> </li> </ul> <p>Lorsque l'isolement du résident est cessé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Procéder au nettoyage et à la désinfection complets (surfaces <i>high touch</i> et <i>low touch</i>) de la salle de toilette et de la chambre</li> </ul>
<b>Proches aidants et visiteurs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Donner accès aux équipements de protection individuelle (ÉPI) et offrir de l'assistance pour les enfiler et les retirer, au besoin</li> <li>➤ Revoir les mesures de prévention des infections à l'arrivée</li> <li>➤ Demander de ne pas utiliser la toilette des résidents</li> </ul>
<b>QUAND SIGNALER L'ÉCLOSION</b>  <b>Direction SAPA</b>  <b>ET</b>  <b>Direction de santé publique (RPA)</b>  <b>OU</b>  <b>Service de prévention et contrôle des Infections (RI)</b>	<p><b>Unité de soins :</b> Dès le début de l'éclosion, c'est-à-dire à partir de 2 cas d'acquisition dans l'unité de soins en 48 h</p> <p><b>Hors unité de soins :</b> Lorsque les critères d'intervention de la santé publique sont atteints, c'est-à-dire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 15 % des résidents (minimum 3 résidents) OU</li> <li>➤ 20 résidents sont atteints dans le secteur touché Peu importe l'intervalle de temps</li> </ul> <p>Direction SAPA à l'adresse suivante : <a href="mailto:rpa.sapa.ciesslerau@ssss.gouv.qc.ca">rpa.sapa.ciesslerau@ssss.gouv.qc.ca</a></p> <p>ET</p> <p>Direction de santé publique à l'adresse suivante : <a href="mailto:maladies.infectieuses.ciesslerau@ssss.gouv.qc.ca">maladies.infectieuses.ciesslerau@ssss.gouv.qc.ca</a></p> <p>OU</p> <p>Service de prévention et contrôle des infections (PCI) à l'adresse suivante : <a href="mailto:soutien.admin.pci.ciesslerau@ssss.gouv.qc.ca">soutien.admin.pci.ciesslerau@ssss.gouv.qc.ca</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Compléter et envoyer le formulaire de signalement d'éclosion et la liste de cas disponible sur le site internet du CISSS des Laurentides: <a href="#">Outils de soutien - Gestions d'éclosion de COVID-19, d'influenza et de gastro</a></li> </ul>