

## Mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) RI-RPA : Virus syncytial (VRS)

UNITÉ DE SOINS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Unité de soins en RPA</li> <li>➤ RI-SAPA</li> </ul>	
HORS UNITÉ DE SOINS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Milieu de vie en RPA</li> </ul>	
SYMPTÔMES ET CONTAGIOSITÉ	
<b>Symptôme clinique compatible avec le VRS</b>	<p>Apparition soudaine de fièvre et toux (nouvelle ou aggravée) OU Apparition soudaine de fièvre OU toux (nouvelle ou aggravée) ET Au moins un symptôme suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mal de tête</li> <li>➤ Mal de gorge</li> <li>➤ Douleurs musculaires ou articulaires</li> <li>➤ Fatigue extrême</li> </ul>
<b>Période de contagiosité</b>	Peu avant le début des symptômes jusqu'à 8 jours après le début des symptômes en moyenne
PRISE EN CHARGE D'UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE	
<b>Dépistage Résident</b>	<p><b>Unité de soins et hors unité de soins</b></p> <p>Le dépistage spécifique du VRS n'est généralement pas recommandé, toutefois le test est inclus lors du dépistage de la COVID-19 et de l'influenza (multiplex), il est possible que vous ayez un résultat de VRS lors de ces dépistages.</p> <p>En présence de symptômes compatibles avec COVID-19<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tester pour COVID-19 et appliquer les précautions additionnelles selon le type de milieux</li> </ul> <p>En présence de symptômes compatibles avec l'influenza pendant la saison grippale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tester pour influenza selon la procédure habituelle</li> </ul>
<b>Dépistage Travailleur de santé (TdeS) Et Travailleur qui est en contact avec les résidents</b>	<p>Il n'y a pas de recommandation concernant le dépistage du VRS chez les travailleurs</p> <p>En présence de symptômes compatibles avec COVID-19<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tester pour COVID-19 et appliquer les mesures en vigueur</li> </ul> <p>En présence de symptômes compatibles avec l'influenza pendant la saison grippale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tester pour l'influenza selon la procédure habituelle (prescription requise d'un médecin)</li> </ul>

<sup>1</sup> Ne pas tester les résidents qui ont eu la COVID-19 dans les 60 derniers jours sauf immunosupprimés

<sup>2</sup> Ne pas tester les travailleurs qui ont eu la COVID-19 dans les 60 derniers jours

## Mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) RI-RPA : Virus syncytial (VRS)

EN PRÉSENCE D'UNE PERSONNE POSITIVE	
<b>Unité de soins</b>	<p>Garder le résident à sa chambre avec les précautions additionnelles gouttelettes-contact (masque médical, jaquette et gants)</p> <p>Jusqu'à 5 jours après le début des symptômes</p> <p>ET</p> <p>Absence de fièvre depuis 48 h (sans prise de médication pour la fièvre)</p> <p>ET</p> <p>Amélioration des symptômes depuis 24h</p>
<b>Hors unité de soins</b>	<p><b>Mesures à appliquer par le résident</b></p> <p><b>Si fièvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Demeurer à sa chambre pour la durée de la fièvre</li> </ul> <p><b>Si toux, mal de gorge ou congestion nasale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Porter le masque médical pour la durée des symptômes</li> </ul> <p><b>Pour les 5 jours suivant l'apparition des symptômes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Respecter la distanciation</li> <li>➤ Éviter les contacts avec les personnes vulnérables (idéalement, éviter les aires communes et la salle à manger)</li> <li>➤ Éviter les événements sociaux non essentiels (ex. : activités de groupe du milieu de vie)</li> </ul> <p><b>Mesure à appliquer par les travailleurs de santé</b></p> <p>Lors de soins aux résidents, appliquer les pratiques de base :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Port du masque médical en présence de symptômes respiratoires</li> <li>➤ Port de la blouse et des gants si risque de contact avec du liquide biologique (ex. : soins hygiène, changement de culotte)</li> <li>➤ Hygiène des mains aux 4 moments</li> </ul>
<b>Gestion des travailleurs symptomatiques ou positifs</b>	<p>Appliquer la politique et procédure du milieu</p> <p>Porter le masque médical jusqu'à disparition des symptômes</p>
<b>Mesures pour les contacts étroits résidents</b>	<p><b>Unité de soins :</b></p> <p>Résident qui a séjourné dans la même chambre OU a reçu des soins d'un TdeS positif qui ne portait pas le masque médical</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Appliquer les précautions additionnelles gouttelettes-contact 72 h après le dernier contact avec le cas infecté et surveiller les symptômes</li> <li>➤ Surveillance des symptômes pour 8 jours</li> </ul> <p><b>Hors unité de soins :</b> Aucune mesure pour les contacts étroits</p>
<b>Mesures pour les contacts étroits travailleurs</b>	<p>Travailleur qui a donné des soins à un résident symptomatique ou positif sans port de masque, jaquette et gants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Surveillance des symptômes pour 8 jours</li> <li>➤ Port du masque médical 72 h</li> </ul>

## Mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) RI-RPA : Virus syncytial (VRS)

<b>MILIEU EN ÉCLOSION</b>	
<b>Sur une période de 16 jours, 2 résidents positifs sur l'unité de soins OU dans le secteur OU la résidence</b>	
<b>Communication</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informer l'ensemble du personnel, les résidents, les familles et visiteurs de l'état de situation et des mesures qui seront en place</li> <li>➤ Afficher à l'entrée du milieu de vie qu'une éclosion est en cours</li> <li>➤ Lors d'un transfert de résident, aviser le centre receveur que le milieu est en éclosion</li> <li>➤ Sensibiliser les résidents à faire l'auto-surveillance des symptômes si possible</li> <li>➤ Rencontrer le personnel               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dresser un portrait de la situation</li> <li>○ Rappeler l'importance de l'hygiène des mains aux quatre moments</li> <li>○ Rappeler les symptômes d'infection respiratoire</li> <li>○ Rappeler l'importance de respecter les procédures de désinfection des petits équipements mobiles partagés et des surfaces de travail (ex. : chariot à médicament, ordinateur, téléphone, presse-pilule, espace de travail)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Mesures de prévention et contrôle des infections</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Surveillance de l'apparition des symptômes des usagers de l'unité de soins</li> <li>➤ Encourager le port du masque médical par les TdeS sur l'unité de soins, la ressource ou le secteur touché</li> <li>➤ Restreindre la circulation dans l'unité ou secteur en éclosion aux TdeS requis pour les soins</li> <li>➤ Assurer la stabilité des TdeS sur l'unité/secteur en éclosion</li> <li>➤ Si les TdeS ne peuvent être dédiés, terminer par les soins aux résidents sur l'unité en éclosion</li> </ul>
<b>Salle à manger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Favoriser des places attribuées aux résidents</li> <li>➤ Favoriser l'hygiène des mains avant les repas et collations</li> <li>➤ Éviter le partage de nourriture ou le matériel partagé sur les tables repas (ex. : salières, poivrières, bac d'ustensiles, etc.)</li> <li>➤ Éviter de récupérer les aliments non consommés fournis</li> </ul>
<b>Aires communes ET Activités sociales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suspendre les soins ou les services offerts par des travailleurs externes à l'unité (ex. : marche, soins des pieds, physiothérapie, animation, bénévolat, groupes communautaires, vente de journaux, coiffure)</li> <li>➤ Reporter les visites porte ouverte du milieu</li> <li>➤ Suspension des activités sociales ou de groupe du secteur touché sauf les services essentiels</li> </ul>
<b>Nettoyage et désinfection</b>	<p>Mettre en place une fréquence de nettoyage et de désinfection des surfaces fréquemment touchées (<i>high touch</i>) dans les aires communes qui est supérieure à une fois par jour (plurifréquence).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Utiliser le guide <a href="#">Hygiène et salubrité dans les milieux de vie RPA, RI et CHSLD</a></li> <li>➤ Établir des routes de travail afin d'augmenter les fréquences de nettoyage et de désinfection :           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Avoir une liste des <i>high touch</i> à nettoyer</li> <li>○ Utiliser un produit virucide et homologué (numéro DIN) par Santé Canada en respectant le temps de contact humide des produits utilisés</li> <li>○ Désinfecter les équipements/matériels de soins si utilisés</li> </ul> </li> </ul> <p>Lorsque l'isolement du résident est cessé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Procéder au nettoyage et à la désinfection complets (surfaces <i>high touch</i> et <i>low touch</i>) de la salle de toilette et de la chambre</li> </ul>

## Mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) RI-RPA : Virus syncytial (VRS)

<b>Proche aidant et visiteur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Donner accès aux équipements de protection individuelle (ÉPI) et offrir de l'assistance pour les enfiler et les retirer, au besoin</li> <li>➤ Revoir les mesures de prévention des infections à l'arrivée</li> </ul>
<b>QUAND SIGNALER L'ÉCLOSION</b>  <b>Direction SAPA</b>  <b>ET</b>  <b>Direction de santé publique (RPA)</b>  <b>OU</b>  <b>Service de prévention et contrôle des infections (RI)</b>	<p><b>Unité de soins</b> : Dès le début de l'éclosion, c'est-à-dire à partir de 2 cas dans l'unité de soins en 16 jours</p> <p><b>Hors unité de soins</b> : Lorsque les critères d'intervention de la santé publique sont atteints, c'est-à-dire : Sur une période de 10 jours</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 15 % des résidents (minimum 3 résidents)</li> </ul> <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 20 résidents sont atteints dans le secteur touché</li> </ul> <p>Direction SAPA à l'adresse suivante : <a href="mailto:rpa.sapa.ciesslerau@ssss.gouv.qc.ca">rpa.sapa.ciesslerau@ssss.gouv.qc.ca</a></p> <p>ET</p> <p>Direction de santé publique à l'adresse suivante : <a href="mailto:maladies.infectieuses.ciesslerau@ssss.gouv.qc.ca">maladies.infectieuses.ciesslerau@ssss.gouv.qc.ca</a></p> <p>OU</p> <p>Service de prévention et contrôle des infections (PCI) à l'adresse suivante : <a href="mailto:soutien.admin.pci.ciesslerau@ssss.gouv.qc.ca">soutien.admin.pci.ciesslerau@ssss.gouv.qc.ca</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Compléter et envoyer le formulaire de signalement d'éclosion et la liste de cas disponible sur le site internet du CISSS des Laurentides : <a href="#">Outils de soutien - Gestions d'éclosion de COVID-19, d'influenza et de gastro</a></li> </ul>