



**RÉFÉRENCE AU PROGRAMME DE L'ACCUEIL CLINIQUE
POUR LA COLIQUE BILIAIRE**

Accueil clinique	Numéro de téléphone	Numéro de télécopieur
Saint-Eustache	450 473-6811, poste 44104	450 473-9959
Saint-Jérôme	450 432-2777, poste 23939	450 431-8764
Sainte-Agathe	819 324-4000, poste 34713 ou 34707	819 324-4092

Condition clinique : _____

Antécédents médicaux : _____

Aide-mémoire des prérequis à l'application de l'ordonnance collective par l'infirmière de l'accueil clinique

Titre de l'ordonnance collective : *Initier des mesures diagnostiques pour un usager présentant une colique biliaire*
OC-CISS-165

- Ordonnance remise à l'usager, s'il y a lieu
- Absence de contre-indication et/ou critères d'exclusion (se référer à la page 2)
- Feuillet d'information remis à l'usager
- Enseignements effectués auprès de l'usager en cas détérioration de sa condition de santé

	Identification du requérant	Identification du répondant (s'il y a lieu)
Nom du médecin ou IPS		
Lieu de pratique		
Numéro de téléphone		
Numéro de télécopieur		
Courriel		

Nom de l'intervenant	Signature	Permis	aaaa/mm/jj

Critères d'exclusion généraux

- Condition de l'état de santé requérant une prise en charge plus urgente que 24 heures
- Usager présentant l'une des conditions suivantes :
 - Altération de l'état de conscience
 - Détérioration sévère ou rapide de l'état général
 - Douleur intense non soulagée par analgésie
 - Dyspnée
 - Fréquence cardiaque supérieure à 110 bpm
 - Fréquence respiratoire supérieure à 30 cpm
 - Pression systolique inférieure ou égale à 90 mmHg
 - Saturation inférieure à 90 %
 - Signes de déshydratation sévère
 - Signes d'hémorragie reliée à un saignement actif
 - Température buccale supérieure ou égale à 38 °C

Critères d'exclusion spécifiques

Référer l'usager à l'urgence si :

- Ascite
- Coagulopathie
- Distension abdominale
- Douleur abdominale intense, soit supérieure à 5 sur une échelle de 1 à 10, ou non soulagée par la prise d'analgésique de type acétaminophène
- Grossesse
- Signe de Murphy¹ positif à la palpation
- Syndrome infectieux (anorexie, diaphorèse intense, frissons, fièvre, ictère)
- Troubles hépatiques connus et actifs (ex. : cirrhose, cholangite sclérosante, hépatite auto-immune)
- Sous traitement d'immunosuppresseurs

¹ Douleur à la palpation de l'hypocondre droit aggravée par l'inspiration profonde et accompagnée de mécanisme de défense