

ANNEXE 1

Usager présentant une hématurie macroscopique asymptomatique

Réception de la demande

Dans un délai de 24 heures :

- Valider les critères d'admissibilité par entrevue téléphonique.
- Vérifier la liste de médicaments ainsi que les antécédents médicaux et chirurgicaux.
- Évaluer l'usager par entrevue téléphonique.
- Pour un usager allergique aux produits de contraste, valider que le référent a prescrit la préparation à l'examen d'imagerie.



Prévoir un RDV le jour même ou dans les 24 à 48 heures ouvrables pour les analyses sanguines et urinaires suivantes :

- APS (chez l'homme de tout âge), BHCG (chez la femme en âge de procréer et non hystérectomisée), Créatinine, Électrolytes, FSC, RNI et Urée (inscrire sur la requête de laboratoire le critère de justification suivant : prérenal)
- Analyse d'urine
 - Si développement des symptômes d'infection urinaire ou si le résultat de l'analyse n'est pas disponible : remplir une requête pour une culture d'urine et s'assurer que l'usager l'effectue dans un délai de 24 à 48 heures.



Si possible, rencontrer l'usager le jour de ses examens afin de compléter l'évaluation infirmière des signes et des symptômes

- Mesurer les signes vitaux (PA, FC, FR, SpO2 et T°).
- Évaluer les signes et les symptômes de saignement, de rétention urinaire et d'infection urinaire selon le PQRSTU.
- Évaluer les symptômes associés au choc.
- Informer l'usager des résultats (si disponibles).



Assurer le suivi des résultats

Analyse d'urine

- Si résultat de protéinurie, cylindres ou globules rouges anormaux :
 - Pour les secteurs de Saint-Eustache, de Sainte-Agathe et de Mont-Laurier : référer l'usager en médecine interne dans un délai de 28 jours.
 - Pour le secteur de Saint-Jérôme : référer l'usager en néphrologie dans un délai de 28 jours.

Culture d'urine

- Si le résultat est négatif, demander :
 - Deux cytologies urinaires (urine par miction) dans un délai de 24 à 48 heures.
 - Une tomographie axiale triple phase dans un délai de 10 jours.
- Si l'usager est connu anémique, demander une tomographie axiale triple phase dans un délai de 3 jours :
 - Si le résultat d'hémoglobine (Hb) est inférieur ou égal à 100 mmol/L.
OU
 - S'il y a une diminution de 20 % par rapport à une valeur de base.
- Une consultation en urologie, après avoir reçu l'ensemble des résultats d'exams diagnostiques dans un délai de 2 semaines suite au dernier examen effectué.
- Si le résultat est positif :
 - Aviser le médecin ou l'IPS traitant ou référent afin que ce dernier puisse initier l'antibiothérapie sans délai.
 - Chez la femme, fin de l'investigation.
 - Chez l'homme, demander une échographie rénale dans un délai de 4 à 8 semaines ET une consultation en urologie dans les 12 semaines suivant la demande initiale pour l'accueil clinique.

RNI

- Usager sous warfarine et présentant une valeur du RNI supérieure ou égale à 10, référer à l'urgence sans délai. Pour tout résultat ne se situant pas dans la valeur ciblée par le référent pour cet usager, confirmer la conduite à suivre auprès du référent.
- Usager ne recevant pas de warfarine et présentant une valeur du RNI supérieure ou égale à 1,5, référer à l'urgence sans délai.



Fermeture de dossier à l'accueil clinique et transmission des informations au médecin l'IPS traitant.