



**RÉFÉRENCE AU PROGRAMME DE L'ACCUEIL CLINIQUE  
POUR LA COLIQUE BILIAIRE**

Accueil clinique	Numéro de téléphone	Numéro de télécopieur
Saint-Eustache	450 473-6811, poste 44104	450 473-9959
Saint-Jérôme	450 432-2777, poste 23939	450 431-8764
Sainte-Agathe	819 324-4000, poste 34713 ou 34707	819 324-4092
Mont-Laurier	819 623-1234, poste 54665 ou 54115	819 623-1896

**Condition clinique** : usager présentant une colique biliaire typique et en l'absence de critères d'exclusion (se référer au tableau au verso)

**Antécédents médicaux :**

- Antécédent de calculs biliaires  Cancer  Chirurgie abdominale récente, préciser : \_\_\_\_\_
- Diabète  Maladie inflammatoire de l'intestin (colite ulcéreuse et Crohn)
- Autre : \_\_\_\_\_

**Aide-mémoire des prérequis à l'application de l'ordonnance collective par l'infirmière de l'accueil clinique**

**Titre de l'ordonnance collective** : *Initier des mesures diagnostiques pour un usager présentant une colique biliaire*  
OC-CISSS-165

- Ordonnance remise à l'usager, s'il y a lieu. Préciser : \_\_\_\_\_

	Identification du requérant	Identification du répondant (s'il y a lieu)
Nom du médecin ou IPS		
Lieu de pratique		
Numéro de téléphone		
Numéro de télécopieur		
Courriel		

Nom de l'intervenant

Signature

Permis

aaaa/mm/jj

**Critères d'exclusion généraux**

- Condition de l'état de santé requérant une prise en charge plus urgente que 24 heures
- Usager présentant l'une des conditions suivantes :
  - Altération de l'état de conscience
  - Détérioration sévère ou rapide de l'état général
  - Douleur intense non soulagée par analgésie
  - Dyspnée
  - Fréquence cardiaque supérieure à 110 bpm
  - Fréquence respiratoire supérieure à 30 cpm
  - Pression systolique inférieure ou égale à 90 mmHg
  - Saturation inférieure à 90 %
  - Signes de déshydratation sévère
  - Signes d'hémorragie reliée à un saignement actif
  - Température buccale supérieure ou égale à 38 °C

**Critères d'exclusion spécifiques**

Référer l'usager à l'urgence si :

- Ascite
- Coagulopathie
- Distension abdominale
- Douleur abdominale intense, soit supérieure à 5 sur une échelle de 1 à 10, ou non soulagée par la prise d'analgésique de type acétaminophène
- Grossesse
- Signe de Murphy<sup>1</sup> positif à la palpation
- Syndrome infectieux (anorexie, diaphorèse intense, frissons, fièvre, ictère)
- Troubles hépatiques connus et actifs (ex. : cirrhose, cholangite sclérosante, hépatite auto-immune)
- Sous traitement d'immunosuppresseurs

<sup>1</sup>Douleur à la palpation de l'hypocondre droit aggravée par l'inspiration profonde et accompagnée de mécanisme de défense