

**Pratique Organisationnelle Requise**  
**Abréviations, symboles et inscriptions dangereuses**  
**à NE PAS utiliser**

Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
des Laurentides

Québec

Les abréviations, symboles et inscriptions numériques retrouvées dans la colonne de gauche ont été impliqués dans des accidents graves liés à la médication. Ils ne devraient JAMAIS être utilisés lors de la communication d'informations liées à la médication.

**Réf Abréviations Dangereuses ISMP 2006**

<b>NE JAMAIS UTILISER</b>	<b>CORRECTIONS</b>
Abréviations du nom des médicaments et des vaccins	Écrire au long tous les noms des médicaments et des vaccins
AC	Écrire « Avant repas » ou « Analyse et culture »
AD, AS, AU	Utiliser « oreille droite », « oreille gauche » et « les deux oreilles »
OD	Écrire « Par jour » ou « DIE »
OD, OS, OU	Utiliser « œil droit », « œil gauche » et « les deux yeux »
CC, cc	Utiliser « millilitres » ou « avec repas »
D/C	Utiliser « Cesser » ou « Congé »
D5, D10	Écrire « Dextrose 5 % » ou « Dextrose 10 % »
Jours de la semaine (L,M,M,J,V,S,D)	Écrire au long ou utiliser les trois premières lettres du jour
NS, SP	Utiliser NaCl 0.9%
QD	Écrire « Par jour » ou « DIE »
QOD	Écrire « un jour sur deux »
SC ou SL	Écrire au long ou utiliser « S.cut. » ou « S.Ling »
U, UI	Utiliser « Unités »
µg	Utiliser « mcg »
@	Utiliser « à »
> ≥	Écrire « plus grand que » ou « supérieur ou égal à »
< ≤	Écrire « plus petit que » ou « inférieur ou égal à »
Ø	Écrire « ne pas » ou « aucun »
+	Écrire « plus » ou « positif »
Zéro à droite du point (1.0 mg)	Ne jamais inscrire un zéro à droite du point Incrire « 1 mg »
Manque un zéro à gauche du point ( .5 mg)	Toujours inscrire un zéro à gauche du point Incrire « 0.5 mg »
Pas d'espace après le nom, la dose. « Inderal40mg »	Utiliser un espace entre le nom et la dose d'un médicament « Inderal 40 mg »
Pas d'espaces entre les unités (Pénicilline 100000 unités)	Utiliser un espace pour les doses supérieures à 1000 (Pénicilline 100 000) ou utiliser le mot « million »