

Note de service

DESTINATAIRES : Médecins de l'Hôpital de Saint-Jérôme

EXPÉDITRICE : Dre Véronique Lapointe, microbiologiste

DATE : 15 mars 2025

OBJET : **DÉFINITION DU TERME VULNÉRABLE À LA ROUGEOLE**

Bonjour,

Plusieurs questionnements ont surgi en lien avec les contacts rougeoles dans les différents secteurs.

Voici la définition du MSSS du terme vulnérable à la rougeole tiré du document suivant :
[Fiche technique pour la gestion des cas, des contacts et des éclosions](#)

Contact considéré comme vulnérable^J ^J Un tel contact est défini ici comme une personne pour laquelle le risque de complications est élevé.	Tout contact qui fait partie de l'un des groupes mentionnés ci-dessous (MSSS, 2003) : <ul style="list-style-type: none">• les enfants de moins de 12 mois;• les femmes enceintes réceptives nées après 1970 (y compris les femmes enceintes nées dans les années allant de 1970 à 1979, et ayant reçu une seule dose de vaccin [CIQ, 2011b])^K;• les personnes immunosupprimées suivantes^L :<ul style="list-style-type: none">- les personnes greffées de la moelle osseuse, peu importe leur âge et leur statut vaccinal et peu importe qu'elles aient eu la rougeole ou non;- les personnes immunosupprimées nées en 1970 ou après et n'ayant pas eu la rougeole (ou n'ayant pas de preuve qu'elles l'ont eue), peu importe leur statut vaccinal.
--	--

Pour les contacts vulnérables, il faut par la suite déterminer si une **prophylaxie post-exposition** est jugée nécessaire. Pour se faire, voici la section du document qui mentionne les conduites à prendre :

Personnes (conditions médicales) ¹	Conduite
Absence ou quasi-absence de système immunitaire fonctionnel <ul style="list-style-type: none"> • Greffe de moelle osseuse (GCSH) dans les derniers 12 mois • Immunodéficience primaire importante 	IgIV, sans sérologie préalable
Immunodépression importante <ul style="list-style-type: none"> • Chimiothérapie immunosuppressive pour une leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) en cours ou complétée • Maladie lymphoproliférative incluant les cancers hématologiques comme un lymphome indolent, une leucémie ou un lymphome à cellules plasmatiques • Transplantation d'organe solide • Greffe de moelle osseuse (GCSH) depuis plus de 12 mois • Thérapies biologiques susceptibles d'enlever l'immunité contre la rougeole (seules ou combinées avec des stéroïdes) en cours ou reçues depuis moins de 12 mois. Cette période peut être raccourcie lorsqu'une thérapie biologique a un effet de plus courte durée • Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) 	Sérologie (recherche d'Ac contre la rougeole) IgIV dans les 7 jours suivant l'exposition si le résultat est négatif ou non disponible en temps opportun
Autres personnes immunodéprimées ne répondant pas à l'un des critères suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Né avant 1970 • Preuve médicale de rougeole • A déjà eu une sérologie positive pour la rougeole • A reçu deux doses de vaccin contre la rougeole 	
Femmes enceintes non vaccinées ou ayant reçu une seule dose de vaccin, sauf si preuve médicale de rougeole ou sérologie antérieure positive pour la rougeole	
Autres personnes immunodéprimées répondant à l'un des critères suivants (ces personnes sont considérées protégées) : <ul style="list-style-type: none"> • Né avant 1970 • Preuve médicale de rougeole • A déjà eu une sérologie positive pour la rougeole • A reçu deux doses de vaccin contre la rougeole 	Pas de sérologie Pas d'IgIV ni de IgIM

p. j. Fiche technique pour la gestion des cas, des contacts et des éclosions — Rougeole — Février 2024

¹ Pour les enfants immunodéprimés pesant moins de 30 kg, utiliser les IgIM