



ORDONNANCE DE DÉTRESSE RESPIRATOIRE D'UN USAGER EN FIN DE VIE

Date : ____/____/____ Heure : ____ : ____

Poids : ____ kg Taille : ____ cm

INF	PHARM	ORDONNANCE																					
		<p>Indication : Détresse respiratoire (i.e., tachypnée, tirage, sécrétions bronchiques, agitation, anxiété sévère, cyanose) ou hémorragie massive chez un usager en fin de vie</p> <p align="center">CONSULTER L'ARBRE DÉCISIONNEL AU VERSO</p> <p><i>L'ordonnance de détresse respiratoire (Versed+opiacé+scopolamine) peut être répétée après 20 minutes pour une fois seulement.</i> <i>Si récurrence de détresse respiratoire après 2 heures et plus, l'ordonnance peut être réappliquée et aviser le médecin.</i></p>																					
		<p align="center">Midazolam (Versed) : À administrer en premier (1^{er})</p> <table border="0"> <tr> <td>Si usager :</td> <td>Donner midazolam:</td> </tr> <tr> <td>- de 70 kg ou moins et prise de benzodiazépine 1 dose die ou moins</td> <td><input type="checkbox"/> 5 mg sous-cutané</td> </tr> <tr> <td>- plus de 70 kg et prise de benzodiazépine de 2 doses die</td> <td><input type="checkbox"/> 7,5 mg sous-cutané</td> </tr> <tr> <td>- Prise de benzodiazépine plus de 2 doses die</td> <td><input type="checkbox"/> 10 mg sous-cutané</td> </tr> </table>		Si usager :	Donner midazolam:	- de 70 kg ou moins et prise de benzodiazépine 1 dose die ou moins	<input type="checkbox"/> 5 mg sous-cutané	- plus de 70 kg et prise de benzodiazépine de 2 doses die	<input type="checkbox"/> 7,5 mg sous-cutané	- Prise de benzodiazépine plus de 2 doses die	<input type="checkbox"/> 10 mg sous-cutané												
Si usager :	Donner midazolam:																						
- de 70 kg ou moins et prise de benzodiazépine 1 dose die ou moins	<input type="checkbox"/> 5 mg sous-cutané																						
- plus de 70 kg et prise de benzodiazépine de 2 doses die	<input type="checkbox"/> 7,5 mg sous-cutané																						
- Prise de benzodiazépine plus de 2 doses die	<input type="checkbox"/> 10 mg sous-cutané																						
		<p align="center">Narcotique : À administrer en deuxième (2^{ième}) (le plus rapidement possible après l'injection de versed)</p> <table border="0"> <tr> <td>Si usager reçoit:</td> <td>Donner en sous-cutané :</td> </tr> <tr> <td>-fentanyl en timbre 50 mcg ou moins</td> <td><input type="checkbox"/> morphine 10 mg ou <input type="checkbox"/> hydromorphone 2 mg</td> </tr> <tr> <td>-fentanyl en timbre 75 à 175 mcg</td> <td><input type="checkbox"/> morphine 15 mg ou <input type="checkbox"/> hydromorphone 3 mg</td> </tr> <tr> <td>-fentanyl en timbre plus de 175 mcg</td> <td><input type="checkbox"/> morphine 20 mg ou <input type="checkbox"/> hydromorphone 4 mg</td> </tr> <tr> <td>-morphine 10 mg et moins sous-cutané aux 4 heures</td> <td><input type="checkbox"/> morphine 10 mg</td> </tr> <tr> <td>-morphine de 11 mg à 30 mg sous-cutané aux 4 heures</td> <td><input type="checkbox"/> morphine 15 mg</td> </tr> <tr> <td>-morphine 30 mg et plus sous-cutané aux 4 heures</td> <td><input type="checkbox"/> morphine ____ mg soit 50 % de la dose q 4 heures pour un max de 50 mg</td> </tr> <tr> <td>-hydromorphone moins de 2 mg sous-cutané aux 4 heures</td> <td><input type="checkbox"/> hydromorphone 1 mg ou <input type="checkbox"/> 2 mg</td> </tr> <tr> <td>-hydromorphone de 2 mg à 6 mg sous-cutané aux 4 heures</td> <td><input type="checkbox"/> hydromorphone 3 mg</td> </tr> <tr> <td>-hydromorphone plus de 6 mg sous-cutané aux 4 heures</td> <td><input type="checkbox"/> hydromorphone ____ mg soit 50% de la dose q 4 heures pour un max de 8 mg</td> </tr> </table>		Si usager reçoit:	Donner en sous-cutané :	-fentanyl en timbre 50 mcg ou moins	<input type="checkbox"/> morphine 10 mg ou <input type="checkbox"/> hydromorphone 2 mg	-fentanyl en timbre 75 à 175 mcg	<input type="checkbox"/> morphine 15 mg ou <input type="checkbox"/> hydromorphone 3 mg	-fentanyl en timbre plus de 175 mcg	<input type="checkbox"/> morphine 20 mg ou <input type="checkbox"/> hydromorphone 4 mg	-morphine 10 mg et moins sous-cutané aux 4 heures	<input type="checkbox"/> morphine 10 mg	-morphine de 11 mg à 30 mg sous-cutané aux 4 heures	<input type="checkbox"/> morphine 15 mg	-morphine 30 mg et plus sous-cutané aux 4 heures	<input type="checkbox"/> morphine ____ mg soit 50 % de la dose q 4 heures pour un max de 50 mg	-hydromorphone moins de 2 mg sous-cutané aux 4 heures	<input type="checkbox"/> hydromorphone 1 mg ou <input type="checkbox"/> 2 mg	-hydromorphone de 2 mg à 6 mg sous-cutané aux 4 heures	<input type="checkbox"/> hydromorphone 3 mg	-hydromorphone plus de 6 mg sous-cutané aux 4 heures	<input type="checkbox"/> hydromorphone ____ mg soit 50% de la dose q 4 heures pour un max de 8 mg
Si usager reçoit:	Donner en sous-cutané :																						
-fentanyl en timbre 50 mcg ou moins	<input type="checkbox"/> morphine 10 mg ou <input type="checkbox"/> hydromorphone 2 mg																						
-fentanyl en timbre 75 à 175 mcg	<input type="checkbox"/> morphine 15 mg ou <input type="checkbox"/> hydromorphone 3 mg																						
-fentanyl en timbre plus de 175 mcg	<input type="checkbox"/> morphine 20 mg ou <input type="checkbox"/> hydromorphone 4 mg																						
-morphine 10 mg et moins sous-cutané aux 4 heures	<input type="checkbox"/> morphine 10 mg																						
-morphine de 11 mg à 30 mg sous-cutané aux 4 heures	<input type="checkbox"/> morphine 15 mg																						
-morphine 30 mg et plus sous-cutané aux 4 heures	<input type="checkbox"/> morphine ____ mg soit 50 % de la dose q 4 heures pour un max de 50 mg																						
-hydromorphone moins de 2 mg sous-cutané aux 4 heures	<input type="checkbox"/> hydromorphone 1 mg ou <input type="checkbox"/> 2 mg																						
-hydromorphone de 2 mg à 6 mg sous-cutané aux 4 heures	<input type="checkbox"/> hydromorphone 3 mg																						
-hydromorphone plus de 6 mg sous-cutané aux 4 heures	<input type="checkbox"/> hydromorphone ____ mg soit 50% de la dose q 4 heures pour un max de 8 mg																						
		<p align="center">À administrer en troisième (3^{ième}) (le plus rapidement possible après l'injection de l'opiacé)</p> <p>Scopolamine <input type="checkbox"/> 0,4 mg sous-cutané ou <input type="checkbox"/> 0,6 mg sous-cutané (Choisir si prise régulière)</p> <p align="center">Vigilance</p> <p>L'administration des médicaments peut se faire soit en sous-cutané direct ou via le papillon identifié au médicament.</p> <p>Toujours contacter le médecin si inefficace après 2 administrations consécutives aux 20 minutes.</p> <p>L'effet bénéfique du traitement débute dans les 10 premières minutes et peut durer de 2 à 4 heures.</p>																					
Nom du médecin en lettres moulées :		No de permis :																					
Signature :																							