



ORDONNANCE INDIVIDUELLE STANDARDISÉE (OIS-129)

Médication si détresse respiratoire ou hémorragique

Allergie(s) : _____

Intolérance(s) aux médicaments : _____

Validité : 7 jours

Taille : _____

Poids : _____

Date	Heure		Pharmacie
Directives :		<ol style="list-style-type: none"> Avant de débuter cette ordonnance, il doit y avoir une évaluation de l'usager par l'infirmière et administré que par cette dernière Après l'administration de 2 doses, l'ordonnance doit être prescrite à nouveau par le médecin traitant 	
		Médication si détresse respiratoire ou hémorragique ** voir au bas de la page pour plus de détails sur les doses à donner**	
		<ol style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Morphine ____ mg sous-cutané STAT Si détresse persiste, répéter 30 minutes plus tard X 1 PRN Ou <input type="checkbox"/> Hydromorphone ____ mg sous-cutané STAT Si détresse persiste, répéter 30 minutes plus tard X 1 PRN 	
		<ol style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Midazolam (versed) ____ mg sous-cutané STAT Si détresse persiste, répéter 30 minutes plus tard X 1 PRN 	
		<ol style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Scopolamine 0.4 mg sous-cutané <input type="checkbox"/> Scopolamine 0,4 mg sous-cutané si râles seulement 	Attention au délirium secondaire
		<ol style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aviser le médecin de garde dès qu'une première dose de médication du protocole est donnée 	
		** Dans l'ordonnance de détresse, on calcule les doses comme suit :	
		<ol style="list-style-type: none"> Patients naïfs aux opiacés : <ol style="list-style-type: none"> Morphine : dose de départ à 5 mg sous-cutané Hydromorphone : dose de départ à 1 mg sous-cutané Patients prenant des opiacés au moins une fois par jour : <ol style="list-style-type: none"> Morphine ou Hydromorphone : <ul style="list-style-type: none"> 2 fois l'entre-dose sous-cutané PRN OU 2 fois la dose régulière aux 4 heures (si en sous-cutané régulier) OU Si timbre fentanyl, longue action ou perfusion continue : 20 % de la dose totale de morphine par 24 Patients naïfs aux benzodiazépines <ol style="list-style-type: none"> Midazolam : dose de départ 5 à 7,5 mg sous-cutané Patients prenant une benzodiazépine au moins une fois par jour (lorazépam, oxazépam, diazépam, temazépam, flurazépam, etc.) <ol style="list-style-type: none"> Midazolam : départ à 10 mg sous-cutané à titrer selon la réponse clinique (ad 20 mg sous-cutané) 	

Signature : _____ Permis : _____ Date : _____