

ALGORITHME HYPERTHERMIE EN TRAVAIL ACTIF - CHORIOAMNIONITE COVID-19

FIÈVRE EN TRAVAIL
Température rectale \geq à 38.5°C
OU
Température buccale \geq à 38.0°C

Présentation compatible avec chorioamnionite clinique

OUI

Résultat du dépistage fait à l'admission disponible (et questionnaire fait moins de 36 heures avant)

Refaire le questionnaire si le dernier fait plus que 36 heures avant

Oui

Non

Faire le dépistage rapide

Négatif

Positif

Négatif

Pas d'isolement nécessaire

Placer l'usagère en précautions additionnelles **Gouttelettes Contacts +**

Pas d'isolement nécessaire

NON

Placer usagère en précautions additionnelles **Gouttelettes Contacts+**

Faire le dépistage rapide si condition de l'usagère pourrait permettre un transfert. SINON (et si test n'est pas déjà en cours), faire test standard

Négatif

Positif

Refaire le dépistage dans 48 heures

Positif

Si positif : usagère en phase de latence et transfert possible : Transférer en centre désigné*

En POST-PARTUM : Transférer dans une zone/chambre CHAUDE de l'UDN **ou** d'une autre spécialité selon l'évolution des symptômes **ou** dans un centre désigné* selon

Négatif

Vérifier la conduite auprès du médecin traitant et/ou PCI

*Tout transfert est coordonné par le médecin traitant et le [Centre de coordination en périnatalogie du Québec](#) (CCPQ).
1 Référence : [MSSS Plan 2e vague Services mère-enfant](#)