Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides
Québec

Stratégie d'atténuation gants nitrile 12 pouces - Oncologie

Manipulation[1] d'un médicament dangereux?
Une ou plus des caractéristiques suivantes :

Cancérogène	Toxique pour un organe
Génotoxique	Tératogène ou toxicité
Toxique pour la reproduction:	dans le développement

Liste des anti-néoplasiques et autres médicaments dangereux NIOSH

ALERTE!
Lorsqu'un gant est testé chimio,
on retrouve la norme **D-6978-05** sur la boite

Oui

Administration[1] de la Carmustine ou ThioTEPA

Oui

Gants médicaux nitrile 12″ testés chimio + milieu humide haut risque

Code de GRM

Très-petit :	42050337	Grand :	42006521
Petit :	42006523	X-Grand :	42006524
Moyen :	42006522		

Non

Administration[1] d'un médicament dangereux solide (comprimés)?

Oui

Gants médicaux nitrile testés chimio 9.5 ″

Code de GRM

Très-petit :	42048256	Grand :	42048263
Petit :	42048260	X-Grand :	42048264
Moyen :	42048262		

Si BO

Gants médicaux standards nitrile 12″ résistants aux produits chimiques

Code de GRM

Petit :	42051268	Moyen :	42051269
Grand :	42051271	X-Grand	42051272

Non

Administration[1] d'un médicament dangereux autre que par voie orale?

Gants médicaux nitrile testés chimio 12″

Code de GRM

Petit :	42016552	Grand :	42016554
Moyen :	42016553	X-Grand :	42016522

Si BO

Gants médicaux nitrile testés chimio 12″

Code de GRM

Petit :	42048260	Grand :	42048263
Moyen :	42048262	X-Grand :	42048264

Si BO

Non

Contact avec les excrétas, soins d'hygiène, prélèvement ou manipulation de la literie contaminée par un usager ayant reçu un médicament dangereux dans les 7 derniers jours?

Oui

Gants médicaux nitrile testés chimio 12″

Code de GRM

Petit :	42016552	Grand :	42016554
Moyen :	42016553	X-Grand :	42016522

Non

Gants médicaux nitrile standards

Code de GRM

Très-petit :	42048256	Grand :	42048263
Petit :	42048260	X-Grand :	42048264
Moyen :	42048262		

ALERTE! Mettre **2 paires de gants résistants aux produits chimiques si :**
- Soins d'hygiène, prélèvements et autres soins ont été en contact avec les excrétas
- La literie est visiblement souillée de médicaments ou d'excrétas
- Pour toute voie d'administration autre que par voie orale solide (comprimés)

Note : Mettre **un gant testé chimio,** suivi d'un **gant résistant aux produits chimiques réguliers** lors de l'administration par **voie topique**

[1]Préparation, manipulation, administration de médicaments dangeureux du goupe 1 selon le NIOSH

© CISSS des Laurentides
Réf. : Appui à une utilisation optimale des gants utilisés pour la manipulation de médicaments du groupe 1, Comité national de coordination du réseau de cancérologie du Qc , 2020