

## CONSIGNES POUR LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ (TdeS) EXPOSÉS À LA COVID-19 + (sans bris de service)

### Consignes pour les TdeS asymptomatiques exposés en milieu de soins (sans bris de service)

<b>Avec IMGA</b>	<b>Type d'exposition au cas confirmé de COVID-19</b>	<b>TdeS considéré partiellement protégé</b> Vacciné 3 doses, vacciné 2 doses ≥ 7 jrs, vacciné 1 dose de Johnson & Johnson ≥ 14 jours après la dose, épisode de COVID-19 ≤ 6 mois, épisode de COVID-19 > 6 mois vacciné 1 dose ≥ 7 jrs	<b>TdeS considéré non protégé</b> Vacciné 1 dose ≥ 14 jrs, vacciné 2e dose < 7 jrs, épisode de COVID-19 > 6 mois à ≤ 12 mois non vacciné ou vacciné 1 dose < 7 jrs, aucun épisode de COVID-19 et non vacciné, aucun épisode de COVID-19 et vacciné 1 dose < 14 jrs, épisode de COVID-19 > 12 mois non vacciné ou vacciné 1 dose < 7 jrs, immunosupprimé vacciné ou non, avec ou sans épisode de COVID-19 confirmé
	Contact lors d'une IMGA : TdeS ne portait pas adéquatement APR de type N-95 <u>ET</u> ne portait pas adéquatement protection oculaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Aucun retrait du travail.</b></li> <li>▶ Respect strict des mesures de PCI.</li> <li>▶ <b>Dépistage par TAAN-labo le plus tôt possible ET chaque 2-3 jours jusqu'à 10 jours après la dernière exposition.</b></li> <li>▶ Autosurveillance des symptômes;</li> <li>▶ Auto-isolement strict lorsqu'au travail (Pas de covoiturage, mange seul malgré présence de séparateurs physiques, distanciation de 2m, etc.),</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Retrait du travail et isolement préventif à la maison pour 10 jours.</b></li> <li>▶ Autosurveillance des symptômes pour une durée totale de 14 jours.</li> <li>▶ <b>Dépistage par TAAN-labo le plus tôt possible ET chaque 2-3 jours jusqu'à 10 jours après la dernière exposition.</b></li> <li>▶ Si était asymptomatique et développe des symptômes, effectuer un autre TAAN dès l'apparition des symptômes.</li> </ul>
<b>Sans IMGA</b>	Contact étroit (< 2 mètres) et prolongé (> 10 minutes cumulées) : TdeS ne portait PAS adéquatement masque médical*		

\*Sans égard au niveau du masque médical (ASTM niveau 1, 2 ou 3) ou au type d'APR.

### Consignes pour les travailleurs de la santé asymptomatiques exposés en communauté (sans bris service)

<b>TdeS considéré partiellement protégé</b> Vacciné 3 doses, vacciné 2 doses ≥ 7 jrs, vacciné 1 dose de Johnson & Johnson ≥ 14 jours après la dose, épisode de COVID-19 ≤ 6 mois, épisode de COVID-19 > 6 mois vacciné 1 dose ≥ 7 jrs	<b>TdeS considéré non protégé</b> Vacciné 1 dose ≥ 14 jrs, vacciné 2e dose < 7 jrs, épisode de COVID-19 > 6 mois à ≤ 12 mois non vacciné ou vacciné 1 dose < 7 jrs, aucun épisode de COVID-19 et non vacciné, aucun épisode de COVID-19 et vacciné 1 dose < 14 jrs, épisode de COVID-19 > 12 mois non vacciné ou vacciné 1 dose < 7 jrs, immunosupprimé vacciné ou non, avec ou sans épisode de COVID-19 confirmé
<p><b><u>AVEC contact ponctuel avec le cas (ex. : souper entre amis) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Aucun retrait</b> du travail.</li> <li>▶ <b>Respect strict</b> des mesures de PCI.</li> <li>▶ <b>Dépistage par TAAN-labo le plus tôt possible ET tous les 2-3 jours jusqu'à 10 jours après la dernière exposition.</b></li> <li>▶ Autosurveillance des symptômes.</li> <li>▶ <b>Auto-isolement strict lorsqu'au travail</b> (Distanciation de 2m, pas de covoiturage, mange seul malgré la présence de séparateurs physiques, etc.).</li> </ul> <p><b><u>AVEC contact domiciliaire limité (ex. le cas est capable de s'isoler) OU AVEC contact domiciliaire avec exposition en continu avec le cas (ex. cas est un très jeune enfant) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Retrait du travail et isolement préventif à la maison pour 10 jours.</b></li> <li>▶ Autosurveillance des symptômes pour une durée totale de 14 jours.</li> <li>▶ <b>Dépistage par TAAN-labo le plus tôt possible ET chaque 2-3 jours jusqu'à 10 jours après la dernière exposition.</b></li> <li>▶ Si était asymptomatique et développe des symptômes, effectuer un autre TAAN-labo dès l'apparition des symptômes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Retrait du travail et isolement préventif à la maison pour 10 jours.</b></li> <li>▶ Autosurveillance des symptômes pour une durée totale de 14 jours.</li> <li>▶ <b>Dépistage par TAAN-labo le plus tôt possible ET chaque 2-3 jours jusqu'à 10 jours après la dernière exposition.</b></li> <li>▶ Si était asymptomatique et développe des symptômes, effectuer un autre TAAN dès l'apparition des symptômes.</li> </ul>

## Consignes pour les travailleurs de la santé symptomatiques (symptômes compatibles avec la COVID-19) (sans bris de service)

<p><b>TdeS considéré partiellement protégé</b></p> <p>Vacciné 3 doses, vacciné 2 doses ≥ 7 jrs, vacciné 1 dose de Johnson &amp; Johnson ≥ 14 jours après la dose, épisode de COVID-19 ≤ 6 mois, épisode de COVID-19 &gt; 6 mois vacciné 1 dose ≥ 7 jrs</p>	<p><b>TdeS considéré non protégé</b></p> <p>Vacciné 1 dose ≥ 14 jrs, vacciné 2e dose &lt; 7 jrs, épisode de COVID-19 &gt; 6 mois à ≤ 12 mois non vacciné ou vacciné 1 dose &lt; 7 jrs, aucun épisode de COVID-19 et non vacciné, aucun épisode de COVID-19 et vacciné 1 dose &lt; 14 jrs, épisode de COVID-19 &gt; 12 mois non vacciné ou vacciné 1 dose &lt; 7 jrs, immunosupprimé vacciné ou non, avec ou sans épisode de COVID-19 confirmé</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Isolement à la maison.</b></li> <li>● Effectuer TAAN-labo dès l'apparition des symptômes. Conduite à tenir selon les résultats : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Positif : Vous référez <a href="#">au tableau sur la levée des isolements des TdeS COVID +</a></li> <li>▶ Négatif : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Amélioration des symptômes : appliquer les modalités locales pour le retour au travail des TdeS. Si un retour est possible, le TdeS doit porter un masque médical en continu pour la durée des symptômes (hygiène et étiquette respiratoires).</li> <li>➢ Augmentation des symptômes : répéter le test TAAN-labo 24 heures post dernier test et poursuivre l'isolement à la maison en attendant les résultats. Si négatif et persistance des symptômes de <u>SAG</u>, planifier un dépistage pour influenza et VRS. Sinon, retour au travail.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	