


Orientation en centre hospitalier selon statut COVID-19¹

Pour usager avec TDAR positif, voir algorithme



1. Pour les usagers ayant eu un épisode de COVID-19 confirmé par TAAN après le 20 décembre 2021, ne pas dépister et diriger en chambre froide.

2. Vous référer au document [COVID-19 : Critères et symptômes](#)

3. Vous référer au document [Levée des mesures d'isolement/critères de guérison COVID-19](#)

4. Vous référer au document [Niveau de protection des usagers ou des travailleurs de santé](#)

Interventions à entreprendre pour une personne présentant un résultat de TAAN « détecté faible quantité d'ARN viral » et ses contacts

Contexte où le TAAN a été réalisé	Symptômes associés à la COVID-19	Recommandations/consignes	Isolement	Contacts
Investigation d'écllosion ou exposition à risque élevé/modéré avec un cas de COVID-19	Absence ou présence	Considérer comme une infection active (cas contagieux)	Oui	Recherche de contacts
Autre indication	Présence d'anosmie (sans congestion nasale), d'agueusie ou de dysgueusie (ou une combinaison de ces symptômes) dans les 10 derniers jours (période de contagiosité)	Considérer comme une infection active (cas contagieux)	Oui	Recherche de contacts
	Asymptomatique ou Symptômes excluant anosmie/agueusie dysgueusie dans les 10 derniers jours (période de contagiosité)	<p>Répéter le TAAN 24 h à 48 h plus tard</p> <p>Considérer comme une infection active (contagieuse) si le 2^e TAAN est « détecté »</p> <p>Si le 2^e TAAN est « détecté faible quantité d'ARN viral », « non détecté » ou « équivoque » : ne pas considérer comme une infection active.</p> <p>Si le 2^e TAAN est « invalide » : soumettre un autre échantillon.</p>	Oui Isolement préventif dans l'attente du résultat	Pas de recherche de contacts sauf si diagnostic COVID-19 retenu (infection active)