



¹ 21 jours si immunosupprimé ou maladie sévère (qui a nécessité des soins intensifs)

Interventions à entreprendre pour une personne présentant un résultat de TAAN « détecté faible quantité d'ARN viral » et ses contacts

Contexte où le TAAN a été réalisé	Symptômes associés à la COVID-19	Recommandations / Consignes	Isolement	Contacts
Investigation d'écllosion ou exposition à risque élevé/modéré avec un cas de COVID-19 ET Autre indication	Présence d'anosmie (sans congestion nasale), d'agueusie ou de dysgueusie (ou une combinaison de ces symptômes) dans les 10 derniers jours (période de contagiosité)	Considérer comme une infection active (cas contagieux)	Oui	Recherche de contacts
	Asymptomatique ou Symptômes excluant anosmie/agueusie dysgueusie dans les 10 derniers jours (période de contagiosité)	<p>Répéter le TAAN 24 h à 48 h plus tard</p> <p>Considérer comme une infection active (contagieuse) si le 2^e TAAN est « détecté »</p> <p>Si le 2^e TAAN est « détecté faible quantité d'ARN viral », « non détecté » ou « équivoque » : ne pas considérer comme une infection active.</p> <p>Si le 2^e TAAN est « invalide » : soumettre un autre échantillon.</p>	Oui Isolement préventif dans l'attente du résultat	Pas de recherche de contacts, sauf si diagnostic COVID-19 retenu (infection active)

Questionnaire pour valider la fiabilité du TDAR +

- 1- Quelle était la date du TDAR positif ?
- 2- Quels étaient vos symptômes à ce moment ?
- 3- Avez-vous été en contact avec un cas **confirmé** de COVID-19 ? (Distance, présence de masque, durée, etc.)
- 4- Est-ce que certains membres de votre entourage ont reçu un résultat positif à la COVID-19 avant et/ou après votre résultat positif ?

Si l'histoire est incertaine, considérez comme non fiable.