

Admission ou retour d'hospitalisation > 24 heures

Mesures à suivre

- Pour un usager ayant séjourné dans la même chambre qu'un cas de COVID-19 dans les 7 derniers jours ou qui provient d'une unité en éclosion sans information si celui-ci a résidé dans la chambre d'un cas de COVID-19 dans les 7 derniers jours, appliquer les PA GC+ pour 5 jours complets. Dépister aux jours 0 et 4 ou 5*.
- Pour un usager ayant séjourné sur une unité en éclosion d'influenza ou VRS, appliquer les PA GC et surveiller les Sx BID durant 72 h.

Contact étroit

- COVID-19 : Usager qui a séjourné dans la même chambre qu'un cas confirmé de COVID-19.
- Autres virus respiratoires :
A séjourné quatre heures et plus dans le même environnement usager (ex. : dans la chambre), à moins de deux mètres et sans mesure barrière qu'un cas confirmé durant sa période de contagiosité;
OU
A reçu des soins à moins de deux mètres d'un TdeS confirmé qui ne portait pas adéquatement le masque médical pendant sa période de contagiosité.

Mesures à suivre

- Pour un contact étroit d'un cas de COVID-19, appliquer les PA GC+ pour 5 jours et dépister aux jours 0 et 4 ou 5*.
- Surveiller les Sx BID durant 7 jours suivant le dernier contact avec le cas de COVID-19. Si apparition de Sx, voir la case *Résident avec symptôme compatible*.
- Pour les autres virus respiratoires, appliquer les PA GC+ pour un minimum de 72 h. Si apparition de Sx, voir la case *Résident avec symptôme compatible*.

Contact élargi

- Usager ne répondant pas à la définition d'un contact étroit;
ET
- Ayant séjourné sur une unité de soins où il y a présence d'un cas confirmé de COVID-19, influenza ou VRS, soit un usager pour lequel il n'y avait pas de PA adéquates en place durant sa période de contagiosité, ou d'un TdeS confirmé de COVID-19 qui ne portait pas adéquatement le masque médical durant sa période de contagiosité;
OU
- COVID-19 seulement : Usager qui a séjourné dans le même environnement qu'un cas confirmé de COVID-19 à moins de 2 mètres et sans mesure barrière durant sa période de contagiosité, mais qui ne partage pas la même chambre avec celui-ci.

Mesures à suivre

- Pour un contact élargi d'un cas de COVID-19, surveiller les Sx BID durant 7 jours suivant le dernier contact.
- Pour un contact élargi d'un cas d'influenza ou VRS, surveiller les Sx BID durant 72 heures.

Résident avec symptôme compatible

- **Sx COVID** : Se référer au tableau [Critères et symptômes de la Covid-19](#).
- **Si Sx respiratoires** : Lors de la saison grippale, dépister pour l'influenza selon l'OC-CISS-126. En dehors de la saison grippale, valider auprès du médecin la pertinence de procéder à ce dépistage.
- Si résident en chambre multiple :
 - ▶ PA GC+ pour les co-chambreurs;
 - ▶ dépistage non requis si aucun Sx.

Mesures à suivre

- PA GC+ avec APR.
- Dépistage COVID jour 0*.
- Deuxième dépistage* 24 à 36 h plus tard si Sx toujours présents et pas de diagnostic différentiel expliquant les symptômes.
- Cesser PA si :
 - ▶ amélioration du tableau clinique depuis 24 h;
 - ▶ absence de fièvre depuis 48 h; et
 - ▶ résultats des dépistages négatifs.

Résident ayant obtenu un résultat positif

- Résultat positif à la COVID-19.
- Résultat positif à l'influenza et/ou VRS, et résultat du **premier** dépistage de COVID-19 négatif.

Mesures à suivre

- PA GC+ avec APR.
- Pour cesser les PA, se référer au [Formulaire FP-CISS-6560](#).
- PA GC+ avec APR jusqu'au **premier** résultat négatif de COVID-19.
- Poursuivre les PA GC pour une durée minimale de 5 jours à partir du début des Sx. Cesser si absence de fièvre depuis 48 h et amélioration du tableau clinique depuis 24 h.

*Ne pas dépister un usager qui a eu un épisode confirmé de COVID-19 dans les 2 derniers mois et moins, sauf les personnes immunosupprimées (vaccinées ou non).

Abréviations

APR : Appareil de protection respiratoire
GC+ : Gouttelette contact +

GC : Gouttelettes contact
PA : Précautions additionnelles

Sx : Symptômes
TdS : Travailleur de la santé

VRS : Virus respiratoire syncytial