

Levée des mesures d'isolement / critères de guérison
(courte durée, hémodialyse, hémato-oncologie, CHSLD, réadaptation)

Situation de l'utilisateur « rétabli » (ayant eu un diagnostic de COVID-19 depuis deux (2) mois ou moins)		Prise en charge
Plus de 10 jours après le début des symptômes	<p>Usager confirmé antérieurement de COVID-19 (test de laboratoire (TAAN), test de dépistage antigénique rapide avec histoire fiable/exposition, lien épidémiologique) avec maladie légère ou modérée</p> <p>ET</p> <ul style="list-style-type: none"> qui rencontre le délai de 10 jours post début des symptômes avec absence de fièvre* depuis 48 heures et amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles). 	Aucune précaution additionnelle requise.
Plus de 21 jours après le début des symptômes	<p>Usager confirmé antérieurement de COVID-19 (test de laboratoire (TAAN), test de dépistage antigénique rapide avec histoire fiable/exposition, lien épidémiologique) avec maladie sévère (i.e. admis ou ayant été admis aux soins intensifs en lien avec la COVID-19 ou ayant nécessité des soins donnés habituellement dans une unité de soins intensifs)</p> <p>ET</p> <ul style="list-style-type: none"> qui rencontre le délai de 21 jours post début des symptômes avec absence de fièvre* depuis 48 heures et amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles). 	Aucune précaution additionnelle requise.
Plus de 21 jours après le début des symptômes	<p>Usager immunosupprimé excluant les immunosupprimés sévères</p> <ul style="list-style-type: none"> Confirmé antérieurement de COVID-19 (test de laboratoire (TAAN), test de dépistage antigénique rapide avec histoire fiable/exposition, lien épidémiologique); ET qui rencontre le délai de plus de 21 jours post début des symptômes avec absence de fièvre* depuis 48 heures et amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles). 	Aucune précaution additionnelle requise.
	<p>Usager immunosupprimé sévère (ex. : greffé d'organes solides, greffé de cellules souches, cancer hématologique sous chimiothérapie)</p> <ul style="list-style-type: none"> confirmé antérieurement de COVID-19 (test de laboratoire (TAAN), test de dépistage antigénique rapide avec histoire fiable/exposition, lien épidémiologique); ET qui rencontre le délai de plus de 21 jours post début des symptômes avec absence de fièvre* depuis 48 heures et amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles). 	<p>Évaluation par l'équipe traitante pour déterminer le besoin ou non de précautions additionnelles.</p> <p>Si risque d'excrétion virale prolongée, instaurer une stratégie de tests de laboratoire de contrôle (ex. : deux tests TAAN sur écouvillon nasopharyngé ou expectorations à intervalle de 24 heures) pour cesser l'isolement au moment opportun.</p>

* Sans prise d'antipyrétique.