

Respecter les mesures d'hygiène de base afin de diminuer le risque de contamination

Hygiène des mains : notamment, en arrivant au travail, suite à une sortie du milieu de travail (ex. : unité, secteur, etc.), après être allé à la toilette et après s'être mouché

Étiquette respiratoire : tousser et éternuer dans le pli du coude

Ne pas toucher votre visage avec vos mains potentiellement contaminées (nez, bouche, yeux)

Garder vos distances entre collègues (au moins 2 mètres)

Le virus responsable de la COVID-19
est facilement éliminé par la plupart des produits nettoyants et désinfectants réguliers

PROCÉDURE DE DÉSINFECTION D'UN ESPACE DE TRAVAIL

Au début de votre service

1. Mettre des gants.
2. Utiliser les lingettes pour nettoyer les objets touchés et manipulés par les mains au poste de travail : bureau, clavier d'ordinateur, souris, lampe, téléphone, écrans tactiles et autres matériels informatiques. Le tampon d'alcool pourrait être utilisé lorsqu'il y a seulement un petit objet à nettoyer, par exemple, un clavier.
3. Laisser la solution désinfectante agir selon le temps de contact préconisé par le type de lingettes utilisées :
Se référer à la note de service [2020-03-26 Lingettes désinfectantes](#) ou sur le contenant du produit pour le temps de contact :
 - **Oxivir TB** (peroxyde d'hydrogène accéléré) : 1 minute
 - Attention : Si absence d'étui avec vitre protectrice (ex. : tablette, téléphone cellulaire), le peroxyde d'hydrogène peut détériorer la fonction « Touch ID » et l'écran tactile de certains appareils
 - **Tampons d'alcool** : 1 minute

Oxivir TB



1 minute

Tampon d'alcool



1 minute

4. Jeter les lingettes souillées et les gants dans la poubelle et pratiquer l'hygiène des mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique

Référence : <https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2970-nettoyage-desinfection-cliniques-medicales-covid19.pdf>