

Levée des précautions additionnelles (isolement) Résident suspecté ou confirmé COVID-19 en milieu de vie

Cas contact	Mesures à suivre
<p>Résident ayant été en contact élargi avec un employé/proche aidant confirmé de COVID-19</p> <p>(Contact élargi : employé avec port d'équipement de protection individuelle tel que recommandé, employé n'ayant pas prodigué des soins prolongés ou cumulés, de deux heures et plus)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de mise en isolement. • Surveillance des symptômes deux fois par jour, pendant les 14 prochains jours. • Dépistage au jour 0. • Si développe des symptômes compatibles à la COVID-19 : mettre en isolement « GOUTTELETTE CONTACT + et appareil de protection respiratoire (APR) », refaire le dépistage et vous référer à la section <i>Résident ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19</i> de ce document. • Si résidents avec des IMGA : mettre en isolement « AÉRIEN CONTACT + » pour 14 jours.
<p>Résident ayant été en contact étroit avec un employé/proche aidant confirmé de COVID-19</p> <p>(Contact étroit : employé sans port d'équipement de protection individuelle OU avec port d'équipement de protection individuelle incomplet OU mal appliqué OU si soins prolongés ou cumulés sont de deux heures et plus)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en isolement « GOUTTELETTE CONTACT + et APR », pendant 14 jours. • Surveillance des symptômes deux fois par jour, pendant les 14 prochains jours. • Dépistage au jour 0, au jour 5 et jour 13. • Si le résultat est négatif et qu'il n'y a pas de symptômes : Lever l'isolement au jour 15. • Si développe des symptômes compatibles à la COVID-19 : refaire un dépistage et vous référer à la section <i>Résident ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19</i> de ce document. • Si résidents avec des IMGA : mettre en isolement « AÉRIEN CONTACT + » pendant 14 jours.
<p>Résident ayant été en contact étroit avec un résident confirmé de COVID-19</p> <p>(Moins de deux mètres ou s'il y a présence d'errance intrusive)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en isolement « GOUTTELETTE CONTACT + et APR », pendant 14 jours. • Si résidents avec des IMGA : mettre en isolement « AÉRIEN CONTACT + » pendant 14 jours. • Surveillance des symptômes deux fois par jour, pendant les 14 prochains jours. • Dépistage au jour 0, au jour 5 et jour 13. • Si le résultat est négatif et qu'il n'y a pas de symptômes : Lever l'isolement au jour 15. • Si développe des symptômes compatibles à la COVID-19 : refaire un dépistage et vous référer à la section <i>Résident ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19</i> de ce document.

Levée des précautions additionnelles (isolement) Résident suspecté ou confirmé COVID-19 en milieu de vie

Cas contact	Mesures à suivre
<p>Résident ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19 (incluant symptômes respiratoires, anosmie, symptômes digestifs et de la sphère ORL pour les clientèles avec ou sans un diagnostic alternatif)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en précautions additionnelles « GOUTTELETTES CONTACTS + et APR ». • Procéder à un dépistage COVID.
	<p>Si le résultat est négatif ET que le résident est un cas qui ne présente plus de symptômes depuis au moins 48h :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cesser les précautions additionnelles après le délai minimal de 5 jours après le début des symptômes. • Poursuivre les mesures si considéré comme un contact étroit (voir ci-haut).
	<p>Si le résultat est négatif ET que le résident est un cas avec symptômes qui s’améliorent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cesser les précautions additionnelles après le délai minimal de 5 jours après le début des symptômes ET en absence de symptômes depuis 48h. • Poursuivre les mesures si considéré comme un contact étroit (voir ci-haut).
	<p>Si le résultat est négatif ET que le résident est un cas avec symptômes qui AUGMENTENT :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aviser le médecin si symptômes à risque de complications graves : difficultés respiratoires, fièvre 37.8 et plus buccale/rectale qui persiste, altération de la conscience, douleur abdominale, diarrhée ou vomissement. • Si symptômes à risque de complications faibles : rhinorrhée, mal de gorge, toux, fatigue, anosmie : procéder à nouveau à un dépistage dans les prochaines 24 à 48 heures. • Si le deuxième dépistage est négatif et que symptômes à risque de complications faibles augmentent : aviser médecin. • Si négatif et que les symptômes s’améliorent : cesser les précautions additionnelles après le délai minimal de 5 jours suivant le début des symptômes et l’absence de symptômes depuis 48h ou poursuivre les mesures, si considéré comme un contact étroit (voir ci-haut).

Levée des précautions additionnelles (isolement) Résident suspecté ou confirmé COVID-19 en milieu de vie

Cas contact	Mesures à suivre
<p>Résident ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19 (incluant symptômes respiratoires, anosmie, symptômes digestif et de la sphère ORL pour les clientèles avec ou sans un diagnostic alternatif)</p>	<p>Si le résultat est négatif ET que le résident est un cas avec symptômes qui PERSISTENT :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procéder à nouveau à un dépistage dans les prochaines 24 à 48 heures. • Si le résultat du deuxième dépistage est négatif et qu'il y a amélioration des symptômes depuis au moins 48 heures : <ul style="list-style-type: none"> • Cesser les précautions additionnelles après le délai minimal de 5 jours suivant le début des symptômes et en absence de symptômes depuis 48h, s'il n'y a eu aucun contact étroit avec un cas confirmé. <p style="text-align: center;">OU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si considéré comme un contact étroit : poursuivre les précautions additionnelles en vous référant à la section contact étroit de ce document. • Si deuxième dépistage est négatif et que les symptômes persistent : aviser le médecin <p>Si le résultat est POSITIF: se référer à la section « Résident ayant un résultat COVID-19 positif » (ci-dessous).</p>
<p>Résident ayant un résultat COVID-19 positif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en isolement « GOUTTELETTES CONTACTS + et APR » ET en zone chaude. • Si résidents avec des IMGA sur unité : les mettre en isolement « AÉRIEN CONTACT + » pendant 14 jours. • Lever l'isolement lorsque le résident est rétabli, selon les critères pour le rétablissement : <i>Levée des mesures d'isolement d'un usager ou employé COVID-19 positif</i>, disponible dans l'intranet section <i>Coronavirus Covid-19/Aide-mémoire, recommandations, procédures et guides</i>.

Levée des précautions additionnelles (isolement) Résident suspecté ou confirmé COVID-19 en milieu de vie

Cas contact	Mesures à suivre
<p>Admission ou retour post hospitalisation plus de 24h ou d'un milieu de réadaptation, d'un résident ayant un résultat de dépistage négatif en provenance :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un centre hospitalier - Un centre de réadaptation - Un autre CHSLD - Une ressource intermédiaire (RI) - Une résidence privée pour aînés (RPA) - Un domicile 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en isolement « GOUTTELETTES CONTACTS + » OU « GOUTTELETTES CONTACTS + et APR » si critères d'expositions ou provient d'un milieu en éclosion. • Surveillance des symptômes, pendant les 14 prochains jours. • Si le résident développe des symptômes compatibles à la COVID-19 : refaire un dépistage et vous référer à la section <i>Résident ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19</i> de ce document. • Si absence de symptômes compatibles avec la COVID-19 : Lever l'isolement au jour 15. • Si résident a des IMGA : mettre en isolement AERIEN CONTACT + pendant 14 jours.