

	ZONE FROIDE RÉSIDENT ADMIS/ RÉINTÉGRÉ DEPUIS PLUS DE 14 JOURS	RÉSIDENTS EN ZONE TIÈDE OU ZONE CHAUDE	RÉSIDENT AVEC STATUT INFECTIEUX INCONNU
	Clientèle visée ¹		
Descriptions	1. Asymptomatique à la COVID-19 ET 2. Sans critère d'exposition dans les 14 derniers jours incluant absence de cas confirmé de COVID-19 sur l'unité depuis les 14 derniers jours. ET 3. Sans séjour hors Canada dans les 14 derniers jours ET 4. Avec test négatif fait depuis 2 semaines OU 1. Infection résolue dans les 3 derniers mois ¹	1. Suspecté ou confirmé à la COVID-19 ET/OU 2. Avec critères d'exposition ET/OU 3. Admission/réintégration avec moins de 14 jours dans le milieu de vie ET/OU 4. Milieu en éclosion	1. Évaluation des symptômes impossible ET/OU 2. Évaluation des critères d'exposition impossible ET/OU 3. Pas de résultat à la COVID-19
<u>IMGA à risque reconnu effectuées en milieu de vie</u> - Ventilation manuelle (excluant code bleu ²) - Aspiration des sécrétions trachéales en circuit ouvert chez un résident intubé ou trachéotomisé - Induction d'expectoration (Instillation de salin) <u>IMGA à risque possible</u> - B-PAP/C-PAP - Trachéotomie ou aspiration profonde via trachéostomie ³ - Optiflow et Airvo	- Port du masque procédure et protection oculaire - Port de la blouse et des gants selon les pratiques de base - **Effectuer un dépistage 2 fois par semaine (au jour 3 et au jour 7)	Isolement : Aérien/Contact + - Chambre à pression négative ou minimalement une chambre privée avec une porte fermée - Respecter le temps d'attente pour le changement d'air (appliquer une attente de 6 heures, si inconnue)	Isolement : Aérien/Contact + - Chambre à pression négative ou minimalement chambre privée avec une porte fermée - Respect du temps d'attente pour le changement d'air ⁶ (appliquer une attente de 6 heures, si inconnue)
IMGA à risque non documenté - Insertion d'un drain thoracique - Nébulisation > 5L ⁴	- Port du masque procédure et protection oculaire - Port de la blouse et des gants selon les pratiques de base - **Effectuer un dépistage 2 fois par semaine (au jour 3 et au jour 7)	Isolement : Gouttelettes/Contact + - Chambre/salle privée - Le test COVID-19 avant ces IMGA est non recommandé	Isolement : Gouttelettes/Contact + - Chambre/salle privée - Le test COVID-19 avant ces IMGA est non recommandé

Les procédures suivantes ne sont pas considérées comme des IMGA :

- Oxygénothérapie conventionnelle avec masque facial (ex. : Ventimask/Venturi)
- Oxygénothérapie via lunette nasale
- Écouvillon nasopharyngé chez l'adulte et l'enfant
- Insertion d'un tube nasogastrique
- Jéjunostomie, gastrostomie

* Lors de situations exceptionnelles, certaines précautions additionnelles pourraient être rehaussées.

** Dépister 2 fois par semaine les résidents avec une infection résolue depuis 3 mois et plus

Précautions additionnelles lors d'IMGA* en milieux de vie (CHSLD, SAD, RI/RPA)

¹ Un résident ayant été considéré rétabli n'a pas besoin de précautions additionnelles, et ce, peu importe le type d'IMGA. En cas de besoin, vous pouvez vous référer à [l'aide-mémoire sur la levée des isolements](#).

² Pour les IMGA reliées à la réanimation cardio-respiratoire (incluant les compressions thoraciques, la ventilation manuelle préintubation et l'intubation), vous référer au [Protocole de réanimation simplifié de la COVID-19 en milieux de vie](#)

³ Les soins de trachéostomie générant possiblement des aérosols sont l'aspiration profonde des sécrétions par la trachéostomie, mais un changement de pansement à ce niveau, une aspiration des sécrétions à l'embouchure de la canule, l'application de soins topiques au site ou le changement de canule ne seraient pas considérés des IMGA.

⁴ À la suite d'une entente CISSS, ces IMGA considérées à risque non documenté par l'INSPQ ont été catégorisées comme des IMGA à risque possible. Le tout sera réévalué périodiquement selon les nouvelles données probantes.