

Niveau de protection des travailleurs de la santé

<p>Considéré protégé contre l'infection</p>	<p>Travailleur de la santé répondant à <u>un</u> des critères suivants (excluant le travailleur immunosupprimé) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ épisode de COVID-19 depuis 3 mois ou moins (vacciné ou non); ➤ épisode de COVID-19 depuis plus de 3 mois ET primovaccination complète (2 doses de vaccin) ET avec 1 dose de rappel (3^e dose); ➤ épisode de COVID-19 depuis plus de 3 mois et 6 mois ou moins ET primovaccination complète (2 doses de vaccin).
<p>Considéré partiellement protégé contre l'infection</p>	<p>Travailleur de la santé répondant à <u>un</u> des critères suivants (excluant le travailleur immunosupprimé) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ épisode de COVID-19 depuis plus de 3 mois et 6 mois ou moins ET primovaccination incomplète ou non vacciné; ➤ épisode de COVID-19 depuis plus de 6 mois et 12 mois ou moins ET primovaccination complète ou incomplète; ➤ épisode de COVID-19 depuis plus de 12 mois ET primovaccination complète (2 doses de vaccin); ➤ aucun épisode de COVID-19 ET primovaccination complète (2 doses de vaccin) et avec ou sans dose de rappel depuis 7 jours ou plus.
<p>Considéré non protégé contre l'infection</p>	<p>Travailleur de la santé répondant à <u>un</u> des critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ épisode de COVID-19 depuis plus de 6 mois et 12 mois ou moins ET non vacciné; ➤ épisode de COVID-19 depuis plus de 12 mois ET non vacciné ou primovaccination incomplète; ➤ aucun épisode de COVID-19 ET primovaccination incomplète; ➤ aucun épisode de COVID-19 ET aucune vaccination; ➤ immunosupprimé vacciné ou non, épisode antérieur de COVID-19 confirmé ou non.

Épisode de COVID-19

Un épisode antérieur de COVID-19 est reconnu s'il a été confirmé :

- Par TAAN-labo ou TAAN-rapide (ex. : ID NOW^{MD}) OU
- Avec un TDAR positif ET une histoire fiable sur l'exposition, les symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19 et la date de test OU
- Par lien épidémiologique : symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19 ET exposition à risque élevé avec un cas confirmé par TAAN ou avec TDAR positif.