

Identification du chargeur :	
Date (aaaa/mm/jj) :	Évaluateur :
Formations suivis : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1- Le chargeur a pris connaissance des documents suivants :	
Consignes concernant l'hygiène personnelle	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Consignes concernant l'espace de travail	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
MSSS – Lavage des mains	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
MSSS – Hygiène des mains	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
MSSS – Hygiène respiratoire	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
MSSS – Port du masque	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
2- Le chargeur est en mesure d'effectuer les tâches suivantes :	
Faire la lecture des gradations sur des seringues de 1mL <i>Place correctement le piston d'une seringue de 1mL à 0,3mL et à deux autres volumes au choix de l'évaluateur</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Faire la lecture des gradations sur des seringues de 3mL <i>Place correctement le piston d'une seringue de 3mL à 1,8mL et à deux autres volumes au choix de l'évaluateur</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Assembler des seringues et des aiguilles de manière appropriée <i>Ouvre et assemble une seringue de 3mL et une seringue de 1mL de manière à ne pas toucher les sites critiques de l'aiguille et de la seringue</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Prélever le diluant de manière appropriée. Faire prélever 1,8mL de NaCl 0,9% au chargeur et vérifier les points suivants :	
<i>Désinfecte le site critique avec un tampon d'alcool</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<i>Ne contamine pas l'aiguille en aucun temps pendant le prélèvement</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<i>Pique le site d'injection avec la technique 45°/ 90°</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<i>Renverse le système et procède au prélèvement sans toucher l'aiguille ni le corps du piston</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<i>Enlève les bulles d'air dans la seringue et ajuste le volume à 1,8mL en gardant l'aiguille dans la fiole</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Injecter le diluant de manière appropriée <i>Inverse la fiole doucement à 10 reprises</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<i>Désinfecte le site critique avec un tampon d'alcool</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<i>Ne contamine pas l'aiguille en aucun temps pendant la dilution</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<i>Pique le site d'injection avec la technique 45° / 90°</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<i>Injecte le diluant doucement, en visant la paroi de la fiole</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<i>Équilibre les pressions en retirant 1,8mL d'air de la fiole</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<i>Inverse la fiole à 10 reprises sans l'agiter</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Prélever les doses de vaccin de manière appropriée <i>Désinfecte le site critique avec un tampon d'alcool avant chaque prélèvement</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<i>Injecte 0,3mL d'air dans la fiole en visant la paroi, sans faire mousser le produit</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<i>Retire 0,3mL de vaccin en ajustant le volume en gardant l'aiguille dans la fiole. Élimine les bulles d'air sans cogner la seringue</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<i>Procède à la préparation des seringues sans contaminer l'aiguille</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non