

## MED-LEG (RÉA. IMPRATICABLE)

En présence de :

- C = Absence de pouls  
&
- A+B = impossibilité d'ouvrir les mâchoires et de ventiler en raison d'une rigidité cadavérique

**Ne faire aucune manœuvre de réanimation**

## MED-LEG (DIRECTIVE NON-RÉA.)

### Critères d'inclusion :

- Document d'attestation de non-initiation de la réanimation
- Ordonnance verbale de non-initiation de la réanimation

### Critères d'exclusion :

- Homicide
- Suicide
- Désaccord parmi les proches de la famille

## RAPPEL DES NORMES

### NORMES RCR

	ADULTE	ENFANT	BÉBÉ
DÉFINITION	À partir des premiers signes de puberté	1 an jusqu'aux premiers signes de puberté	Jusqu'à 1 an
FRÉQUENCE	100 – 120/minute	100 – 120/minute	100 – 120/minute
RATIO	30:2	1 intervenant 30:2 2 intervenants 15:2	1 intervenant 30:2 2 intervenants 15:2
TECHNIQUE	2 mains	1 ou 2 mains	2 doigts
PROFONDEUR	1/3 de la profondeur thorax	1/3 de la profondeur thorax	1/3 de la profondeur thorax

### NORME ASSISTANCE VENTILATOIRE

	ADULTE	ENFANT	BÉBÉ
DÉFINITION	À partir des premiers signes de puberté	1 an jusqu'aux premiers signes de puberté	Jusqu'à 1 an
RATIO	1 ventilation / 5-6 secondes	1 ventilation / 3-5 secondes	1 ventilation / 3-5 secondes

## DAVG - CŒUR MÉCANIQUE

Si inconscient...



1. Installer le DEA
2. Ne pas masser le patient
3. Effectuer seulement des ventilations
4. Téléphoner au CH selon les directives

### SUSPICION TRAUMA



Évite de basculer la tête.  
Faire subluxation

Version 1.0 (Novembre 2019)

Cette aide-mémoire est à l'intention de premiers intervenants policiers ayant suivi la formation initiale SQ-DEA ou Police-DEA avec le CISSS des Laurentides.

Pour plus d'information consultez :

[www.santelaurentides.gouv.qc.ca](http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca)



Coordination des services préhospitaliers d'urgences

## AIDE-MÉMOIRE PREMIERS INTERVENANTS POLICIERS



# RCR / DEA

## MED-LEG (RÉA. IMPRATICABLE)

En présence de :

- C = Absence de pouls  
&
- A+B = impossibilité d'ouvrir les mâchoires et de ventiler en raison d'une rigidité cadavérique

**Ne faire aucune manœuvre de réanimation**

## MED-LEG (DIRECTIVE NON-RÉA.)

### Critères d'inclusion :

- Document d'attestation de non-initiation de la réanimation
- Ordonnance verbale de non-initiation de la réanimation

### Critères d'exclusion :

- Homicide
- Suicide
- Désaccord parmi les proches de la famille

## RAPPEL DES NORMES

### NORMES RCR

	ADULTE	ENFANT	BÉBÉ
DÉFINITION	À partir des premiers signes de puberté	1 an jusqu'aux premiers signes de puberté	Jusqu'à 1 an
FRÉQUENCE	100 – 120/minute	100 – 120/minute	100 – 120/minute
RATIO	30:2	1 intervenant 30:2 2 intervenants 15:2	1 intervenant 30:2 2 intervenants 15:2
TECHNIQUE	2 mains	1 ou 2 mains	2 doigts
PROFONDEUR	1/3 de la profondeur thorax	1/3 de la profondeur thorax	1/3 de la profondeur thorax

### NORME ASSISTANCE VENTILATOIRE

	ADULTE	ENFANT	BÉBÉ
DÉFINITION	À partir des premiers signes de puberté	1 an jusqu'aux premiers signes de puberté	Jusqu'à 1 an
RATIO	1 ventilation / 5-6 secondes	1 ventilation / 3-5 secondes	1 ventilation / 3-5 secondes

## DAVG - CŒUR MÉCANIQUE

Si inconscient...



1. Installer le DEA
2. Ne pas masser le patient
3. Effectuer seulement des ventilations
4. Téléphoner au CH selon les directives

### SUSPICION TRAUMA



Évite de basculer la tête.  
Faire subluxation

Version 1.0 (Novembre 2019)

Cette aide-mémoire est à l'intention de premiers intervenants policiers ayant suivi la formation initiale SQ-DEA ou Police-DEA avec le CISSS des Laurentides.

Pour plus d'information consultez :

[www.santelaurentides.gouv.qc.ca](http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca)



Coordination des services préhospitaliers d'urgences

## AIDE-MÉMOIRE PREMIERS INTERVENANTS POLICIERS



# RCR / DEA

## C-A-B



MOINS DE 10 SECONDES

Si pas de pouls = DEA/RCR

Si pouls présent sans respiration =  
assistance ventilatoire

## ADULTE

À partir des premiers signes de puberté



Ratio	30 :2
-------	-------


## ENFANT et BÉBÉ

Bébé : de la sortie de l'hôpital jusqu'à 1 an  
Enfant : de 1 an à signes de puberté



Ratio	1 intervenant 30 :2 2 intervenants 15 :2
-------	---

## PROTOCOLE DEA



Jusqu'à signes de vie ou arrivée des  
paramédics

## C-A-B




MOINS DE 10 SECONDES

Si pas de pouls = DEA/RCR

Si pouls présent sans respiration =  
assistance ventilatoire

## ADULTE

À partir des premiers signes de puberté




Ratio	30 :2
-------	-------

## ENFANT et BÉBÉ

Bébé : de la sortie de l'hôpital jusqu'à 1 an  
Enfant : de 1 an à signes de puberté



Ratio	1 intervenant 30 :2 2 intervenants 15 :2
-------	---



Jusqu'à signes de vie ou arrivée des  
paramédics